

Terlipressin (Glypressin), OP/IVA, Region Jönköpings län

Komposition för injektion för indikation blödande esofagusvaricer

Terlipressin 1 mg/8,5 mL	ordinerad mängd (mL)
--------------------------	----------------------

Beredning

1. Dra upp ordinerad mängd Terlipressin i en lämplig spruta.

Dosering

Standarddos: Ges som injektion under 3-5 minuter. Upprepas var 4:e till 6:e timme i max 48 timmar.

Dosen anpassas efter patientens vikt:

- Under 50 kg: 1 mg (=8,5 mL)
- 50 - 70 kg: 1,5 mg (=12,8 mL)
- Över 70 kg: 2 mg (=17 mL)

Komposition för sprutpump för indikation hepatorenalt syndrom (HRS)

Terlipressin 1 mg/8,5 mL	2 x 8,5 mL
--------------------------	------------

Beredning

1. Dra upp 17 mL Terlipressin i en spruta avsedd för sprutpump.

Dosering

Standarddos: Ges som kontinuerlig infusion 2-4 mg/24 h (= 0,7-1,4 mL/h)

Dosökning vid uteblivet svar till 6-12 mg/24 h (= 2,1-4,25 mL/h) i max två veckor.

Observera

Ska inte samadministreras med andra läkemedel.

Vid HRS ska samtidigt Albumin-infusion ges, 1 g/kg (max 100 g) dag 1 sedan 40 g/dag. Ska inte kombineras med Noradrenalin.

Hållbarhet och förvaring

Terlipressin SUN förvaras i kylskåp.

Hållbarhet 12 timmar efter beredning.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län.

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT