

Fentanyl (plåster) (Durogesic, Fentanyl, Matrifen)

Vad är fentanyl?

Fentanyl är ett morfinliknande läkemedel som används vid långvarig och svår smärta.

Fentanyl verkar kraftigt smärtstillande genom att blockera smärtsignaler till hjärnan. Ämnet frisätts gradvis från plåstret och går via huden in i blodomloppet.

Hur använder man fentanyl?

Fentanylplåstret sätts fast på en rengjord hårfri hudyta på överkroppen. Vid behandlingsstart tar det 12-24 timmar för att uppnå effekt. Flera plåster kan kombineras för att uppnå den bästa effekten. I regel behöver plåstret bytas ut var 3:e dygn. Då väljs en ny frisk hudyta ut för det nya plåstret. Följ de anvisningar om dosering som du fått av din läkare. Fentanyl kan periodvis kombineras med kortverkande smärtstillande medel vid så kallad genombrottsmärta. Efter användning av plåstret innehåller det fortfarande viss mängd läkemedel. Lämna därför in använda plåster på ett apotek. Du kan redan vid uthämtande av läkemedlet be att få med en påse avsedd för detta.

Viktigt

Om du glömt att byta plåster bör du göra det så fort som möjligt för att undvika genombrotts-smärtor. Utsättningsbesvär kan förekomma om behandlingen avslutas tvärt. Vid behandling i mer än en vecka ska dosen minskas i samråd med din läkare. Om man använder fentanyl tillsammans med alkohol ökar risken för andningsproblem och medvetandesänkning. Kombinera därför inte medicinen med alkohol utan att rådgöra med din läkare. Plåstret får inte utsättas för värmestrålning som tex värmedynor då det kan medföra att för stora mängder läkemedel

tas upp. Plåstret bör skyddas med klädesplagg under heta sommardagar. Vid feber högre än 39 grader bör du omedelbart höra av dig till sjukvården till exempel

sjukvårdsupplysningen. Plåstret behöver eventuellt avlägsnas tills kroppstemperaturen har normaliserats.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa läkemedel bör inte kombineras. Tala därför om för din läkare vilka andra läkemedel du använder, även receptfria läkemedel eller naturläkemedel.

Biverkningar

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar. Fentanyl kan ge trötthet, illamående och svettningar. Dessa biverkningar är vanligast i början av behandlingen och försvinner oftast vid fortsatt användning. Det är du själv som kan bedöma om du är tillräckligt alert för bilkörning. Förstoppning är en vanlig bieffekt vid behandling med morfinliknande substanser. Du kan behöva använda laxermedel regelbundet för att förebygga detta. Muntorrhet är en vanlig biverkan vid fentanylbehandling och ökar risken för hål i tänderna. För att minska denna risk kan du använda fluortillskott eller receptfria salivstimulerande medel. Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta din läkare eller sjuksköterska.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se. Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.