

Lugnande medicin i samband med tandbehandling av barn

Ibland ger tandläkaren ditt barn en lugnande medicin före tandbehandlingen. Det är för att barnet inte ska känna ängslan eller oro vid behandlingen. Medicinen hjälper också barnet att glömma om tandbehandlingen har varit obehaglig. För att få snabb effekt ges antingen flytande medicin att svälja eller flytande medicin i ändtarmen via en plastpip. Det känns ungefär som att ta tempen.

Viktigt att tänka på inför behandling med lugnande medicin

- Barnet får inte äta fast mat, soppa, fil, yoghurt eller liknande eller dricka mjölk senare än 4 timmar före behandlingen.
- Det går bra att dricka vatten eller saft, det vill säga klar dryck, fram till 1 timma innan behandlingen. Drink inte juice.
- Senare än 1 timma före behandlingen får barnet inte dricka någonting alls.

Så fungerar den lugnande medicinen

- Medicinen gör att barnet slappnar av och blir mindre ängsligt.
- Medicinen påverkar förmågan att komma ihåg. Därför glömmet barnet oftast helt bort tandbehandlingen.
- Medicinen verkar avslappnande på muskulaturen och påverkar balansen.
- Ibland händer det att barnet trots medicineringen blir argt eller ledset under eller efter tandbehandlingen.

Tänk på detta efter behandlingen

Efter avslutad tandbehandling får ni stanna kvar på kliniken tills det har gått cirka 1 timma från det att barnet fått medicinen.

Effekten av medicinen sitter kvar i kroppen under flera timmar. Det är därför mycket viktigt att en vuxen sitter bredvid barnet under hemresan från kliniken och att barnet sitter fastspänt i bilstol eller med säkerhetsbälte. En vuxen ska också hålla barnet under uppsikt resten av dagen även om barnet skulle somna. Utomhuslek, lek i trappor och cykelåkning ska undvikas.

Kom ihåg att barnet minns vad du berättar om händelseförloppet. Tala om hur duktig han/hon var och hur bra det gick!