

## Högspecialiserad utredning i Linköping – svår hjärnskada med långvarig medvetandestörning

Bedömning av patient på vårdavdelning



Innehållsansvarig:  
Johanna Trinks | Sjuksköterska - Specialistsjuksköterska Medicin

Godkänd av:  
Wolfram Antepohl | Läkare - Verksamhetschef

Dokumentnummer:  
33549

Version:  
1

Giltigt fr o m:  
2020-05-08

### MCS smärtbedömning vid svår hjärnskada

Patient:  
Datum:

Analgetika:

Område	Poäng			Kl:	Kl:	Kl:
	0	1	2			
<b>Andning</b>	Normal	Stundtals ansträngd andning alt. korta stunder med hyperventilation	Ljudlig ansträngd andning alt. långa perioder med hyperventilation			
<b>Negativ vokalisering</b>	Ingen	Stundtals stönande eller stänkande	Högjutt stönande eller stänkande alt. gråtande			
<b>Ansiktsuttryck</b>	Leende eller uttryckslös	Ledsen, skräm, rynkar pannan, lätt grimasering	Uttalad grimasering som respons till misstänkt smärtsamt stimuli			
<b>Kroppsspråk</b>	Avslappnad/lugn	Spänd alt. motoriskt orolig	Rigid alt. markerad tonisk hållning			
<b>Möjligt att lugna?</b>	Inget behov	Avledbar alt. lugnad av röst eller beröring	Omöjligt att lugna eller avleda			
<b>Fysiologiska förändringar</b>	Inga	Lätt stegring av vitalparametrar (temp, puls, bltr etc.)	Markant stegring av vitalparametrar, svettning, blekhet/rodnad			
<b>Förekomst av smärtsamma åkommor</b>	Inga	Lätta förändringar ex. tryckmärken, tidigare läkta skador, lättare kontrakturer	Markanta förändringar ex. sprickor o huden, aktiv artrit eller bennybildning, svår artrit/kontrakturer			
			<b>TOTALT</b>			

Royal College of Physicians (2013) Prolonged Disorders of Consciousness, National Clinical Guidelines. Ss 30-31