

Levaxin

Vad är Levaxin?

Levaxin är ett läkemedel som används för att tillföra sköldkörtelhormon vid underfunktion i sköldkörteln (hypotyreos). Levaxin innehåller en syntetisk framställd form av det kroppsegna sköldkörtelhormonet tyroxin.

Hur tar man medicinen?

Svälj tabletten hel med lite vatten. Tabletten bör tas på samma sätt varje dag i förhållande till matintag eftersom upptaget av Levaxin ändras beroende på om du tar det tillsammans med mat eller mellan måltid. En rekommendation är att ta Levaxin 30 minuter innan frukost.

Undvik helst att äta kalcium och järn – antingen via tillskott eller mat – inom 2 timmar efter att du tagit Levaxin.

Det är viktigt att följa de anvisningar om dosering som du fått av din förskrivare. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och minskar samtidigt risken för biverkningar. Försök göra det till en vana att ta medicinen vid samma tillfälle varje dag. Välj ett tillfälle som passar ihop med dina dagliga rutiner, då kommer du lättare ihåg att ta medicinen.

Om du glömt att ta medicinen så ta nästa dos som vanligt. Ta inte två doser samtidigt för att kompensera för glömd dos.

Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en regelbunden behandling. En behandling ska alltid avslutas i samråd med förskrivare.

Graviditet

Under en graviditet är det viktigt med normal sköldkörtelhormonnivå. Vid graviditet behöver dosen av Levaxin dessutom ökas. Inför en planerad graviditet bör sköldkörtelhormonnivån ha kontrollerats via blodprov någon gång senaste året. Om du blir gravid och behandlas med Levaxin ska du kontakta din behandlande läkare så snart som graviditet konstaterats.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa mediciner bör inte användas tillsammans. Därför är det mycket viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner du använder. Berätta även om du använder receptfria mediciner eller naturläkemedel.

Biverkningar

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar. Upplevda biverkningar av Levaxin kan bero på att du tagit en för hög dos under en längre tid eller att dosökningen skett för snabbt. Då kan du exempelvis få hjärklappning, huvudvärk, diarré, nervositet eller svettningar. Om du upplever detta bör du kontakta din läkare.

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se. Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.