

Myelom Lenalidomid (Revlimid)

Kuintervall: 28 dagar

Indikation: Multipelt myelom.

	Substans (handelsnamn)	Dos per administreringstillfälle	Adm. tillfälle/dygn	Antal doser per kur	Adm.	Dag
A	Lenalidomid (Revlimid)	25 mg (fast dos)	1	21	p.o.	1-21
B	Dexametason	20-40 mg (fast dos)	1/vecka	4*	p.o.	1, 8, 15,22

Övrigt

* Dexametason 20-40 mg 1 dag per vecka. Steroiden kan sättas ut när stabil respons erhållits.

- Överväg profylax mot virusinfektion samt pneumocystis jirovecii.
- **Behandlingslängd:** till uppnådd platåfas eller beroende på toxicitet.
- Utvärdering (M-komponent) efter varje cykel. Vanligen ges 4-6 cykler.
- Andra kombinationer kan förekomma. Eventuellt reduktion av dexametason vid påtagliga steroidbiverkningar.
- [Lenalidomid-dexametason kunskapsbanken RCC](#)
- [Provtagning, rutinmässig](#)
- **Att observera**
 - Försiktighet vid njurfunktionsnedsättning, dosreduktion?
 - Trombosrisk? Mindre än för thalidomid, men försiktighet vid tidigare trombos.
 - Neuropati? Mindre risk än med thalidomid, men observans på symptom.

Teratogent: om patient/partner är fertil kvinna ska adekvat antikonception användas!

Patientinformation

- [Patientinformation från kunskapsbanken RC](#)
- [Akut - när söka hematologiska sektionen medicinkliniken Eksjö akut?](#)
- [Akut - när söka hematologiska sektionen medicinkliniken Ryhov akut?](#)
- [Akut - när söka hematologiska sektionen medicinkliniken, Värnamo sjukhus akut](#)

	Att göra	Var ordinerat
1.	Informera patienten om respektive läkemedel. Recept, biverkningar, provtagning och uppföljning.	Cosmic (för recepten)
2.	Säkerställ att patienten vet att alla apotek inte har läkemedlen i lager. Oftast går det att få tillgång till läkemedlen inom 2 dygn efter att patienten har kontaktat sitt lokala apotek. Be patienten att använda expeditiosapoteket på sjukhuset.	