

Dantrolennatrium (Agilus), OP/IVA Region Jönköpings län

Komposition

Dantrolen (Agilus) (pulver)	120 mg
Sterilt vatten för injektion	20 mL

Beredning

1. Dra upp 20 mL sterilt vatten och tillsätt till Dantrolennatrium (Dantrium) 120 mg pulver.
2. Skaka flaskorna tills all substans har löst sig.
3. Efter beredning innehåller flaskan en totalvolym på 22,6 mL. Koncentrationen Dantrolen i beredningen blir ca 5,3 mg/mL

Dosering

Startdos: 2,5 mg/kg ges som snabb intravenös injektion.

Dosen 2,5 mg/kg kan upprepas var 10:de minut tills symtom avklingat. Om en kumulativ dos på 10 mg/kg eller mer övervägs, bör diagnosen malign hypertermi omprövas.

För alla kroppsvikter bör startdosen och eventuella upprepade doser inte överstiga 300 mg (motsvarar 2,5 injektionsflaskor)

Doseringsexempel efter kroppsvikt för att uppnå en startdos på 2,5 mg/kg både för vuxna och barn				
Antal injektionsflaskor att bereda	Kroppsviktsintervall	Kroppsvikt	Dos att administrera	Volym att administrera
1	Upp till 48 kg	3 kg	7,5 mg	1,4 mL
		6 kg	15 mg	2,8 mL
		12 kg	30 mg	5,6 mL
		24 kg	60 mg	11,3 mL
		48 kg	120 mg	22,6 mL
2	Från 49 kg till 96 kg	72 kg	180 mg	33,9 mL
		96 kg	240 mg	45,2 mL
3	Från 97 kg	120 kg	300 mg	56,5 mL
		144 kg	300 mg	56,5 mL

Hållbarhet och förvaring

Hållbarhet efter beredning: 24 timmar i rumstemperatur.

För lagerhållning: se svepa.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län. **KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**