

Lymfom BEACOPDAC eskalerad 21d

Cytodose=" Lymfom BEACOPDAC 21d"

Indikation

Hodgkinlymfom, avancerat, unga patienter, kurativ intention.

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings- tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings- tillfällen/dygn	Doser/cyke/kurl	Adm	Dag
A	Cyklofosamid (Sendoxan)	1250	1	1	i.v.	1
B	Doxorubicin (Adriamycin)	35	1	1	i.v.	1
C	Mesna (Uromitexan)	i.v 250 mg/m ² , p.o 500 mg/m ²	3	3	i.v/po	1
D	Etoposid (Vepesid)	200	1	3	i.v	1-3
E	Vinkristin (Oncovin)	1,4 (maxdos=2 mg/dostillfälle)	1	1	i.v.	8
F	Bleomycin* (Bleomycin)	10 000 E /m ²	1	1	i.v.	8
G	Dakarbacin	250 mg /m ²	1	1	i.v.	2-3
H	Prednison	100 mg (fast dos)	1	8	p.o.	1- 14
I	PEG Filgrastim	Standarddos 6 mg	1	1	s.c.	4

* Kumulativ dos > 400 000 E eller > 70 år ökar risken för lungtoxicitet. Hos patienter som är aktuella för operation eller strålbehandling mot lungvävnad bör inte > 300 000 E ges.

	Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9-20 (paus)	Dag 21 ny cykel/kur	
A	Cyklofosamid	A	-	-	-	-	-	-	-	-		
B	Doxorubicin	B			-	-	-	-	-	-		
C	Mesna	CCC	-	-	-	-	-	-	-	-		
D	Etoposid (Vepesid)	D	D	D	-	-	-	-	-	-		
E	Vinkristin	-	-	-	-	-	-	-	E	-		
F	Bleomycin	-	-	-	-	-	-	-	F	-		
G	Dakarbacin	-	G	G	-	-	-	-	-	-		
H	Prednison	K	H	H	H	H	H	H	H	H (dag 9-14)		
I	PEG Filgrastim	-	-	-	I	-	-	-	-	-		

Övrigt

- Infertilitet beaktas
- Om patienten får frossa och feber i samband med eller efter Bleomycin ges steroider t ex Solu-Cortef 100 mg i.v. Solucortef ges därefter profylaktiskt vid varje behandling.
- Vid lungtoxicitet utsättes Bleomycin
- Överväg T. Allopurinol 300 mg 1x1 under behandlingstiden, samt preliminärt tom 1 månad efter sista kur.
- [Perifer neuropati, monitorering](#)
- Profylax mot virus-svampinfektioner samt mot pneumocystis jiroveci
- Högemetogen med avseende på antiemetika. Se cytodose/ELAS. Riskbedöm illamåenderisk. Akynzeo finns i regimen- OBS! interagerar med flera läkemedel. Överväg även olanzapin 2,5 mg-5 mg (max 10 mg/dygn)
- I Cytodose finns underlag för flera dosnivåer
- Doxorubicin rödfärgar urinen.
- Patienten ska uppmanas att dricka rikligt.
- [Provtagning, rutinmässig](#)
- [kunskapsbanken RCC](#)

Dosreduktion hematologi

- Se de-eskaleringsschema (separat dokument).

Substans	Neutrofila	Neutrofila	Neutrofila	TPK	TPK	TPK
	$\geq 0,5$	0,5-0,2	$\leq 0,2$	≥ 75	50-74	≤ 50
Cyklofosamid, Doxorubicin, Etoposid, Dakarbacin	100%	75 %	Behandlingen uppskjutes 3-7 dagar	100%	75 %	Behandlingen uppskjutes 3-7 dagar

Dosreduktion övrigt

- Dosreducera Etoposid vid S-Albumin <30

Patientinformation

- [Akut, när söka hematologiska sektionen, Länssjukhuset Ryhov akut?](#)
- [Infektion, råd riktade till särskilt infektiöskänsliga](#)
- [Patientinformation från kunskapsbanken RCC](#)

Körschema BEACOPDAC eskalerad -21 - dag 1

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Ge tablett Deltison (Prednison)		cytodose
2	Sätt dropp 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml kopp	1 timme	
3	Ge antiemetika		cytodose
4	Ge mesna iv	3 min	cytodose

5	Ge Cyklofosamid spädd i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	60 min	cytodose
6	Ge Doxorubicin spädd i 250 Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	30 min	cytodose
7	Ge Etoposid spädd i 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	1,5 timme	cytodose (Konc <0,4 mg/ml)
8	Ge tablett Mesna 6 timmar efter start av Cyklofosamid		cytodose
9	Ge tablett Mesna 10 timmar efter start av Cyklofosamid		cytodose

Körschema BEACOPDAC eskalerad -21, dag 2-7

Dag	Att göra	Var ordinerat
2-3	Ge infusion Etoposid spädd i 1000 ml i 1 timme, (ofta uppdelat på 2 påsar med ca 45 min infusionstid/påse).	cytodose
2-3	Ge infusion Dakarbacin spädd i 250 mg natriumklorid under 30 minuter	cytodose
2-8	Dela tablett Prednison för dag 2-14	cytodose
4	Ge PEG filgrastim och säkerställ att patienten kan injektionsteknik	

Körschema BEACOPDAC eskalerad -21, dag 8

Dag	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
8	Ge tablett Prednison (om patienten ej tagit det hemma)		cytodose
	Sätt spoldropp 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml för spolning före och efter respektive läkemedel.		
	Vid behov - ge antiemetika (brukar inte behövas)		cytodose
	Ge Vinkristin spädd i 100 Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	5-10 min	cytodose
	Ge Bleomycin spädd i 250 ml Natriumklorid 9mg/ml som intravenös infusion	30 min	cytodose