

Propiomazin (Propavan)

Vad är Propavan?

Propavan används vid olika typer av sömnbesvär. Det kan vara att du har svårt att somna, att du vaknar flera gånger under natten eller att du vaknar för tidigt på morgonen.

Propavan verkar lugnande och dämpande på vissa områden i hjärnan.

Hur tar jag Propavan?

Ta tabletterna tillsammans med vätska. Följ de anvisningar om dosering som du fått av din läkare. Du ska ta Propavan 30 till 60 minuter innan du går och lägger dig.

Det finns ingen risk att bli beroende av läkemedlet.

Var försiktig med läkemedlet vid högre ålder (>75år) då du kan vara mer känslig för Propavan och drabbas av exempelvis dagtrötthet.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Vissa läkemedel bör inte kombineras. Tala därför om för din läkare vilka andra läkemedel du använder, även receptfria läkemedel eller naturläkemedel.

Biverkningar

Läkemedlet har i första hand positiva effekter men ibland kan de ge biverkningar. Propavan kan ge dåsighet och det är du själv som kan bedöma om du är tillräckligt alert för bilkörning. Vissa kan känna av rastlöshet i benen och muskelspänningar. Muntorrhet är vanligt, vilket ökar risken för håll i tänderna. Detta kan förebyggas med fluortillskott eller receptfria salivstimulerande medel.

Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta din läkare.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.