

## PVK-hantering - Förslag på patientinvolvering

### Patientens delaktighet i vården

En korsrevision har genomförts med fokus på **patientens delaktighet i sin vård**. Resultatet visar att patienterna inte alltid upplever sig vara delaktiga, trots att de uttrycker en önskan om ökad delaktighet. Utifrån detta bedöms det finnas förbättringspotential i att **involvera patienten mer aktivt i sin vård**, exempelvis vid hantering av **perifer venkateter (PVK)**.

En kort intervju har även genomförts med en patient gällande delaktighet kring sin PVK. Patienten upplevde detta som mycket positivt och betonade vikten av att i samband med insättning få tydlig information om **varför PVK sätts**. Vidare diskuterades hur denna information skulle kunna göras **mer synlig och tillgänglig för patienten**, exempelvis genom skriftlig eller visuell information.

Vi har därför tagit fram en informationslapp som man kan skriva ut och lägga på patientens rum. (PVK – patientinformation)

- Förklara för patienten varför det sätts en PVK och hur länge en sådan kan sitta.
- Be patienten att vara uppmärksam kring sin PVK
  - om den har börjat läcka
  - om patienten har blivit röd runt instickstället.
- Informera patienten att det finns en informationslapp om PVK inne på rummet. (PVK – patientinformation)

### Identifiera riskpatienter

Riskpatienter inkluderar patienter som behandlas med **kärlretande antibiotika**, vilket medför en ökad risk för tromboflebit. I dessa fall kan det vara lämpligt att överväga **central venös infart**, i linje med hur infektionskliniken i Jönköping arbetar vid behandling med särskilt kärlretande antibiotika, exempelvis **Cloxacillin**. Denna möjlighet har diskuterats och stämmts av med verksamhetsutvecklare på infektionskliniken.

En annan grupp riskpatienter är patienter som är **oroliga eller har kognitiv svikt/demens**. Dessa patienter kan ha en tendens att pilla på eller försöka avlägsna PVK. För att minska risken för detta kan det vara lämpligt att **linda PVK så att den inte är lika synlig**. Ytterligare en åtgärd är att se över valet av infart; om patienten har en **grov PVK** kan denna avlägsnas och ersättas med en **mindre dimension**, om behandlingen tillåter det.