

Prognosgradering			Grad A	Grad B	Grad C
Kriterier	Direkt bedömning av sjukdomsutveckling (progressionshastighet)	Dokumentation (kliniska data/ röntgenbilder) beträffande klinisk fästeförlust/ benförlust	Ingen klinisk fästeförlust/benförlust över 5 år	≤ 2 mm klinisk fästeförlust/benförlust över 5 år	≥ 2 mm klinisk fästeförlust/benförlust över 5 år
	Indirekt bedömning av sjukdomsutveckling (progressionshastighet)	Case phenotype	Omfattande mängd plack/tandsten och visuella sjukdomstecken tillsammans med ringa grad av stödjevävnadsförlust	Mängd plack/tandsten och visuella sjukdomstecken korrelerar till omfattningen av stödjevävnadsförlust	Omfattningen av stödjevävnadsförlust är stor i förhållande till förekomst av plack/tandsten och visuella sjukdomstecken. Vissa mönster av sjukdomsutveckling kan ge indikation om snabb sjukdomsutveckling, t.ex. molar/incisiv-lokalisation
Modifierande faktorer		Rökning	Icke-rökare	Rökare; <10 cig/dag	Rökare; >10 cig/dag
		Diabetes	Normala blodsockervärden Ingen diabetesdiagnos	Välinställd diabetes	diabetes med dålig blodsockerkontroll

*Bestämning av benförlust vid den värst drabbade tanden i förhållande till patientens ålder, dvs benförlust i % av rotlängd dividerat med ålder.