

Desmopressin (Octostim) för infusion, OP/IVA Region Jönköpings län

För intravenös infusion 15 – 20 minuter

Komposition för infusion

Desmopressin 15 mikrogram/mL	0,6 - 2 mL (se dostabell nedan)
Natriumklorid 9 mg/mL	100 mL

Beredning

1. Dra upp rätt volym (se nedan) i en spruta och tillsätt till en infusionspåse med 100 mL Natriumklorid 9 mg/mL.

Dosering

Standarddos: 0,3 mikrogram/kg, se tabell 1.

Ges som intravenös infusion under 15 - 20 minuter.

Sätt volympumpens flöde på 300 mL/h och volymen (VSSI) på 100 mL.

Tabell 1. Standarddos 0,3 mikrogram/kg av Desmopressin 15 mikrogram/mL.

Vikt (kg)	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Dos (mL)	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
Dos (mikrogram)	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5	24	25,5	27	28,5	30

Dosen kan upprepas 1 - 2 gånger med 6 - 12 timmars mellanrum. Detta är dock ovanligt.

Dubbelkontrollera alltid med läkare innan ytterligare dos administreras.

Observera

Dosen ges under övervakning. För patienter där intravenös infusion är olämplig kan Desmopressin ges subkutan.

Vid subkutan administrering ges Desmopressin utspädd.

Den maximala effekten av Desmopressin erhålls inom 1 - 2 timmar vid subkutan tillförsel.

Hållbarhet och förvaring

Förvaras i kylskåp.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT