

Riktlinje

För användning av Vyndaqel (tafamidis) vid transtyretinamyloidosis inom sydöstra sjukvårdsregionen. Framtagen av RSG Läkemedel 2022-01-19

Bakgrund

TLV har beslutat att Vyndaqel 61 mg ingår i läkemedelsförmånerna från och med 2021-09-01 vid behandling av vuxna med kardiomyopati samt:

- 1) ATTRwt (förvärvad sjukdom) eller
- 2) ATTRv (ärfvlig sjukdom) utan betydande amyloidossymtom från andra organ än hjärtat.

Patienter ska ha symtomgivande hjärtsvikt, ventrikulär septumtjocklek >12 mm på ekokardiografi eller tecken på ökad volymsbelastning i hjärtat som lett till behov av diuretika.

Användning subventioneras endast vid förskrivning av specialist inom kardiologi med särskild kunskap inom området.

NT-rådet har lämnat en [rekommendation](#) om hur användning av Vyndaqel praktiskt ska ske. Utifrån denna rekommendation gäller följande för sydöstra sjukvårdsregionen:

Insättning och utvärdering av behandling

- Sker vid Universitetssjukhuset i Linköping, Kardiologiska kliniken US, hjärtviktssektionen
 - enligt kriterier i rekommendationen från NT-rådet
 - och genom registrering i kvalitetsregistret SveATTR

Avslutande av behandling

- Sker vid Universitetssjukhuset i Linköping enligt kriterier i rekommendationen från NT-rådet

Mer information: NT-rådets rekommendation Vyndaqel (tafamidis) 61 mg 2021-09-03