

## Amiodaron (Cordarone) 15 mg/mL, OP/IVA Region Jönköpings län, Gäller BARN vid A-HLR

### Komposition för injektion

Amiodaron 50 mg/mL	6 mL
Glukos 50 mg/mL	14 mL

### Beredning

1. Dra upp 14 mL Glukos 50 mg/mL i en 20 mL-spruta.
2. Dra upp 6 mL Amiodaron 50 mg/mL i en 10 mL-spruta.
3. Tillsätt Amiodaron 50 mg/mL till 20 mL-sprutan med Glukos 50 mg/mL.
4. Blanda noga. Koncentrationen Amiodaron i beredningen blir 15 mg/mL.

### Dosering

Ges som en snabb intravenös injektion enligt tabell nedan.

Dosen är 5 mg/kg enligt HLR-algoritm, vilket motsvarar 0,33 mL/kg. Se tabell.

Vikt (kg)	3	5	10	20	30	40	50	
Ålder (ungefärlig)	0	3 mån	1 år	5 år	9 år	12 år	14 år	Vuxendos
Amiodaron 15 mg/mL (mL)	1	1,7	3	7	10	13	17	20

### Observera

Endast i samband med Avancerad hjärt-lungräddning på barn.

Spola infarten efter given injektion då läkemedlet är kraftigt kärlretande.

Får ej spädas med Natriumklorid 9 mg/mL eftersom fällning kan uppstå.

### Hållbarhet och förvaring

Används omedelbart efter beredning.

### Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterska och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**