

Triagering och prioritering av akutpatienter som kontaktar Folk tandvården

ALLMÄNTILLSTÅND

Om jakande svar

- Feber eller påverkat allmäntillstånd
- Symptom på luftburen smitta

Råd och information

- Feber/påverkat allmäntillstånd "hängig" kan vara ett symptom på infektion och att patienten behöver akuttandvård.
- Neka inte en patient med påverkat allmäntillstånd akuttandvård med anledningen feber.

Åtgärd

- Akut tandvårdsbehov och jakande svar
- Erbjud vårdtid utifrån den odontologiska bedömningen
- Åtgärd för att undvika smittspridning
 - Direkt hänvisa patienten till behandlingsrum.
 - Skyddsförkläde, visir, andningsskydd

ODONTOLOGISK BEDÖMNING

Frågor för att identifiera behov och odontologisk prioritering

- *Beskrivning av akut besvär:* Vilka besvär har du?
- *Tid och framkallning:* När började besvären? Konstanta eller tillfälliga besvär? Uppkom besväret i samband med någon händelse?

Frågor

Värk <ul style="list-style-type: none"> • Beskriv hur värken upplevs? • Hur länge har du haft ont? • Kan du sova på natten? • Har du tagit smärtlindring? 	Svullnad/infektion <ul style="list-style-type: none"> • Har du feber/allmänpåverkad? • Är du svullen? • Var är du svullen? • Sväljsvårigheter? 	Fraktur/lös tand eller besvär av konstruktion <ul style="list-style-type: none"> • Vad har hänt? • Hur är besvären? • Lokalisation 	Olycksfall/yttre våld <ul style="list-style-type: none"> • Vad har hänt och när i tid? • Har du varit i kontakt med sjukvården? 1177? • Vilka besvär har du? • Kan du stänga munnen? Känns det som vanligt när du biter ihop? 	Besvär efter utförd vård <ul style="list-style-type: none"> • Besvär efter fyllning • Besvär efter rotfyllning • Komplikationer efter kirurgiska ingrepp
--	---	--	--	--

Åtgärd

Tid samma dag <ul style="list-style-type: none"> • Pulserande smärta • Kraftigt ihållande och molande smärta • Vaknar på natten av värk • Behov av smärtlindring dagligen <p><i>Rekommendera vid stark smärta smärtlindring inför tandvårdsbesöket.</i></p>	Hänvisa till akuten på sjukhus <ul style="list-style-type: none"> • Svullen munbotten • Kan inte svälja 	Tid samma dag <ul style="list-style-type: none"> • Lös implantatkonstruktion • Lossnad temporär fyllning under pågående rotbehandling • Frakturerad/lossnad fyllning/krona/bro och samtidiga symptom från tand eller slemhinna • Protesskav som påverkar tuggfunktion <p><i>Lös konstruktion - undvik belastning</i> <i>Protesskav – använd protes inför besök.</i> <i>Pågående rotbehandling - viktigt tät fyllning.</i></p>	Konsultera tandläkare och hänvisa till akutmottagningen eller 112 Allvarligt trauma	Tid omgående (direkt) <ul style="list-style-type: none"> • Postoperativ blödning <p><i>Bit på en kompress eller ren handduk vid behov.</i></p>
	Tid omgående (direkt) <ul style="list-style-type: none"> • Svullen munbotten/tunga • Feber • Svårt att svälja • Extraoral svullnad 		Tid omgående (direkt) <ul style="list-style-type: none"> • Slagit ut permanent tand • Permanent tand ändrat läge • Bettet stämmer inte, kan inte bita ihop <p><i>Utslagen vuxentand – Roten ska skyddas från uttorkning och ska inte rengöras/gnuggas. Håll i tandkronan, ej roten. Skölj roten i linsvätska eller vatten 10 sek. Förvara tanden i hålet (alveolen), i ett glas med mjölk eller linsvätska eller i en vuxen persons mun (saliv).</i></p>	Tid samma dag <ul style="list-style-type: none"> • Postoperativ värk/svullnad efter kirurgiskt ingrepp • Konstant värk eller besvär efter fyllningsterapi/rotfyllning
Tid inom en vecka <ul style="list-style-type: none"> • Smärta bara vid mat och dryck • Värk kommer och går <p><i>Kontrollera om det är dags för undersökning, helhetsundersökning är att föredra om det är dags för undersökning och lätta och ej konstanta besvär.</i></p>	Tid samma dag <ul style="list-style-type: none"> • Svårt att gapa • Svullnad/bula vid tand utan feber 	Tid samma dag, ej medicinskt akut Frakturerad konstruktion i framtandsområdet	Tid samma dag <ul style="list-style-type: none"> • Primär tand lös eller utslagen • Slagit av del av permanent tand <p><i>En mjölkttand ska inte sättas tillbaka i hålet vid utslagning.</i></p>	Tid inom en vecka <ul style="list-style-type: none"> • Värk kommer och går, med besvär efter fyllningsterapi/rotfyllning <p><i>Postoperativa lätta besvär kan vara normalt och är ofta övergående. En kontroll bokas.</i></p>
		Tid inom en månad Fraktur av tand/fyllning utan symptom. <i>Återkom om besvären blir värre.</i>	Tid inom en vecka Flisa av/mindre tandfraktur utan andra symptom	

DOKUMENTATION

Journalför patientens beskrivning, om råd och information ges till patienten och vilken åtgärd som utförs.