

KEES-behandling

Vad är KEES-behandling?

KEES-behandling med cytostatika som används vid metastaserad prostatacancer. Behandlingen består av fem läkemedel, Estracyt (estramustin), Sendoxan (cyklofosfamid), Vepesid (etoposid), Fungoral (ketoconazol) och Prednisolon (prednisolon). Dessa läkemedel tas i cykler om två veckor, se bifogat schema.

Hur tar man medicinen?

Du behöver två dosetter, en för respektive vecka. Tabletterna ska tas minst 1 timme före eller två timmar efter måltid. Det är även viktigt att du sväljer dem tillsammans med vatten. Du får inte svälja dem tillsammans med mjölk eller grapefruktjuice. Försök göra det till en vana att ta medicinen vid samma tid varje behandlingsdag. Tabletterna ska inte tuggas eller krossas.

Vad är rätt dos för mig?

Vi reagerar olika på mediciner. Din dosering kan behöva justeras under behandlingstiden. Det är viktigt att du inte på egen hand avbryter behandlingen. Rådgör med din läkare om du är tveksam till fortsatt medicinering.

Glömda doser

Om du glömt att ta din medicin bör du försöka ta den så fort som möjligt. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa tablett ska du inte ta någon extra.

Provtagning

Provtagning under behandlingen sker enligt läkarens ordination. Du får besked av din kontaktsjuksköterska när provtagning ska ske.

Om du ska vaccinera dig (tex. mot influensan), bör du rådgöra med din kontaktsjuksköterska.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa mediciner bör inte användas tillsammans. Därför är det viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner du använder. Berätta även om du använder receptfria mediciner eller naturläkemedel.

Biverkningar

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar.

En del som får behandling med KEES kan uppleva aptitlöshet, ändrad hårkvalitet, magbesvär i form av illamående, kräkning, eller diarré. Vid misstanke om omfattande och/eller oacceptabla biverkningar bör du kontakta din läkare/kontaktsjuksköterska.

Det är viktigt att du rapporterar till kontaktsjuksköterska eller läkare om du har tecken på infektion, eftersom KEES-behandlingen kan påverka ditt immunförsvar.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.