

Temozolomid – vid malignt melanom (Tamodal, Temomedac, Temozolomid, Temozolomide)

Vad är temozolomid?

Temozolomid är ett läkemedel som används för behandling av malignt melanom, en typ av hudcancer. Läkemedlet kan bromsa tillväxten och spridningen av cancer.

Hur tar man medicinen?

Temozolomid-dosen tas i behandlingscykler. Först tas temozolomid-dosen dagligen under fem dagar, därefter kommer 23 dagar där du inte ska ta temozolomid. Sen börjar behandlingscykeln om. Du ska ta kapslarna på fastande mage, antingen 1 timme före eller 2 timmar efter måltid. Förslagsvis tas kapslarna på kvällen. Var sedan noga med att skölja ner dem ordentligt.

Kapslarna ska inte tuggas, krossas eller öppnas

Vad är rätt dos för mig?

Din läkare bestämmer vilken dos och hur många kapslar du ska ha baserat på din längd och vikt. Din dosering kan behöva justeras under behandlingstiden. För vissa personer räcker en lägre dos för att ha nytta av läkemedlet. Det är viktigt att du inte på egen hand avbryter behandlingen. Samråd med din läkare om du är tveksam till fortsatt mediciner.

Glömda doser

Om du glömt att ta din medicin bör du försöka ta den så fort som möjligt. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa dos, kontakta din mottagning.

Provtagning

Provtagning under behandlingen sker enligt läkarens ordination. Du får besked av din kontaktsjuksköterska när provtagning ska ske.

Om du ska vaccinera dig (t.ex. mot influensan), be din kontaktsjuksköterska om råd.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa mediciner bör inte användas samtidigt. Därför är det viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner inklusive receptfria mediciner eller naturläkemedel du använder.

Biverkningar

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar. Av temozolomid kan du bland annat uppleva aptitlöshet, huvudvärk, förstoppning, illamående, kräkningar, utslag, håravfall och trötthet. För att förebygga illamående rekommenderas du att ta Ondansetron ca 30-60 minuter före temozolomid. Mår du illa dagarna efter avslutad behandling kan läkaren skriva ut en medicin som heter Primperan. För att undvika förstoppning är det bra att ta Cilaxoraldroppar vid behov. Det är viktigt att du rapporterar till din kontaktsjuksköterska eller läkare om du har tecken på infektion, eftersom temozolomid kan sätta ner ditt immunförsvar. Temozolomid kan också påverka blodplättarna vilket kan medföra att du lättare får blåmärken eller blödningar. Om du misstänker att du fått omfattande och/eller oacceptabla biverkningar bör du kontakta din läkare/kontaktsjuksköterska.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.