

Dihydralazin (Nepresol) 5 mg/mL, BOLUS, OP/IVA, Region Jönköpings län

Komposition för intermittent bolusinjektion

Dihydralazin 25 mg (pulver)	1 st
Bifogad spädningsvätska (sterilt vatten)	2 mL
Natriumklorid 9 mg/mL	3 mL

Beredning

1. Tillsätt 2 mL bifogad spädningsvätska till pulver Dihydralazin. Blanda noga. Koncentrationen Dihydralazin i stamlösningen blir 12,5 mg/mL.

2. Dra upp 3 mL Natriumklorid 9 mg/mL i en 5 mL-spruta och dra upp stamlösningen i samma spruta.

Blanda noga. Koncentrationen Dihydralazin i beredningen blir 5 mg/mL.

Dosering

Standarddos: 2,5 - 5 mg (0,5 - 1 mL) ges intravenöst direkt.

Vänta 30 minuter innan eventuell nästa dos.

Maximal dygnsdos: 100 mg.

Observera

Bör undvikas vid intrakraniell tryckstegring. Kan ge plötsligt uttalat blodtrycksfall - ge små doser långsamt.

Licensläkemedel

Hållbarhet och förvaring

Förvara ampuller i ytterförpackning, ljuskänsligt.

Hållbarheten efter beredning är 12 timmar.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT