

Mepivakain (Carbocain)-adrenalin + Natriumvätekarbonat (Natriumbikarbonat), OP, Jönköping/Eksjö

Komposition

Mepivakain-adrenalin 10 mg/mL + 5 mikrogram/mL	1 x 20 mL injektionsflaska
Natriumvätekarbonat 50 mg/mL	5 mL

Beredning

1. Dra upp 5 mL Natriumvätekarbonat 50 mg/mL i en 20 mL-spruta.
2. Dra upp 15 mL Mepivakain-adrenalin 10 mg/mL + 5 mikrogram/mL i samma spruta.
3. Spruta blandningen fram och tillbaka i injektionsflaskan så att allt blandas.
4. Totalvolymen blir 25 mL som finns BÅDE i sprutan och i injektionsflaskan.

Dosering

Infiltrationsanestesi ges i hud av operatören med valfri spets för att minska patientens obehag vid bedövning av hud.

Observera

Ges vid polikliniskt, mindre operationer ÖNH-kliniken.

Ges som lokalanestesi vid insättande av venport.

Hållbarhet och förvaring

Carbocain-adrenalin förvaras i kylskåp i ytterkartong. Ljuskänsligt.

Beredningen görs omedelbart före administrering.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT