

Duloxetin (Aritavi, Cymbalta, Duloxetin, Duloxetine)

Vad är duloxetin?

Duloxetin är ett läkemedel som används mot smärta som helt eller delvis orsakats av en irritation eller skada i nervsystemet (neuropatisk smärta). Duloxetin verkar genom att öka halten av vissa signalsubstanser i kroppen (noradrenalin och serotonin) som är smärtstillande och därmed stärks kroppens eget system för smärtlindring.

Duloxetin används även för behandling av depression eller ångest.

Hur tar man medicinen?

Duloxetin kapslar kan tas med eller utan mat. Kapseln bör sväljas hel med vatten. Medicindosen trappas upp och anpassas individuellt. Vanligen börjar behandlingen med 30 mg en gång dagligen och efter en vecka ökas dosen till 60 mg en gång dagligen. Den effektiva dosen varierar mellan olika individer.

Följ de anvisningar om dosering som du fått av din läkare. Då får du bästa möjliga resultat av behandlingen. Gör det till en vana att ta medicinen vid samma tillfälle varje dag. Välj doserings-tillfälle som passar ihop med dina dagliga rutiner, då kommer du lättare ihåg att ta medicinen.

Om du glömt att ta din medicin bör du ta den så fort som möjligt. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa kapsel/tablett ska du inte ta någon extra. Du bör inte sluta ta duloxetin utan att ha diskuterat detta med din läkare eller mottagningssköterska. Om din behandling ska avslutas bör det ske gradvis.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa läkemedel bör inte kombineras. Tala därför om för din läkare vilka andra läkemedel du använder, även receptfria läkemedel eller naturläkemedel.

Biverkningar

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar. Duloxetin kan orsaka yrsel, sömnhet och nedsatt koncentrationsförmåga. Du bör inte köra bil, sköta avancerade maskiner eller delta i andra aktiviteter som kan vara riskfyllda innan du vet hur denna medicinering påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.

Alkohol kan förstärka läkemedlets biverkningar. Du avråds därför från att dricka alkohol under användningen av duloxetin.

De vanligaste biverkningarna är illamående, huvudvärk och trötthet. Under behandlingen bör du vara noggrann med din munhygien. Muntorrhet är en vanlig biverkan vid duloxetinbehandling och ökar risken för hål i tänderna. För att minska denna risk kan du använda fluortillskott eller receptfria salivstimulerande medel.

Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta din läkare eller sjuksköterska.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.