

Riktlinjer vid bettavvikelser

<i>Bettutvecklingsstadium</i>	<i>Viktigt att uppmärksamma</i>	<i>Förslag på egen åtgärd i allmäntandvården</i>	<i>Rekommenderad handläggning</i>
<i>Primära bettet</i> <i>Ca 3–6 år</i>	Korsbett	Kontrollera sugvana. Rekommendera minskad sugtid/avsluta ovana.	Avvakta med konsultation tills permanenta 6:or i överkäken är helt erupterade.
	Öppna bett	Kontrollera sugvana. Rekommendera minskad sugtid/avsluta ovana.	
<i>Tidigt växelbett</i> <i>Ca 6–7 år</i> <i>6:or och 1:or nyligen erupterade</i>	Inverterade 1:or i ök		Konsultation med foto eller modell. Ta även foto i RP. Notera tvångsföring
	Inverterade 2:or i ök	Avvakta permanenta tänder eruption.	
	Eruptionstörning i fronten		Konsultation med io röntgen och foto eller modell.
	Ektopisk eruption 6:or	Avvakta. Vid problem med hygien eller infektion – extrahera 05:an.	
	Saxbitning 6:or		Konsultation med foto eller modell.
<i>Ca 7–8 år</i> <i>2:or inför/under eruption</i> <i>6:or helt erupterade</i>	Frontalt öppna bett	Avsluta eventuell sugvana.	
	Platsbrist för 2:or		Vid mycket uttalad platsbrist: konsultation med modell och panorama. Platsbrist är av sådan omfattning att serieextraktion kan övervägas.
	Unilateralt exfolierade 03:or	Extraktion av motstående sidas 03:a.	
<i>Ca 9-10 år</i> <i>2:a-2:a helt erupterade</i>	Tvångsförande korsbett		Konsultation med foto eller modell. Ta foto även i RP. Notera tvångsföring.
	Stora horisontella överbett	Avvakta permanenta tänder eruption.	Konsultation med modell när permanenta tänder erupterat. Notera läppslut.
	Aplasi 2:or ök		Konsultation med foto eller modell, panorama, io röntgen.
	Aplasi premolarer		Konsultation med modell, panorama.
	Ektopiskt läge 3:or	Röntgenkontroll, lägesbestämning, ev. extr 03:or; se separat dokument.	

Riktlinjer vid bettavvikelser

<i>Bettutvecklingsstadium</i>	<i>Viktigt att uppmärksamma</i>	<i>Förslag på egen åtgärd i allmäntandvården</i>	<i>Rekommenderad handläggning</i>
<u><i>Sent växeltbett</i></u> <i>Ca 10–12 år</i>	Ektopiskt läge premolarer		Konsultation med panorama och/eller io rtg. Foto eller modell om utrymmesavvikelse föreligger.
<i>Premolarer under växling</i>	Platsbrist sidopartier		Mycket uttalad platsbrist: konsultation med modell, panorama. Platsbrist är av sådan omfattning att extraktioner kan övervägas.
	Saxbitning premolarer		Konsultation med foto eller modell.
	Primära tänder som ej exfolierar	Extrahera primära tanden om position på efterföljande tand påverkas.	
	Stor horisontell överbitning med ansträngt läppslut	Avvakta permanenta tänder eruption	Konsultation med foto eller modell, panorama.
<u><i>Tidigt permanent bett</i></u> <i>Ca 12–14 år</i>	Retinerade 3:or		Remiss med modell, panorama, intraoral röntgen i 2 projektioner.
<i>7:or och premolarer nyligen erupterade</i>	Enstaka icke funktionsstörande korsbitning	Accepteras.	
	Ektopisk eruption 7:or i uk		Konsultation med foto eller modell, panorama.
	Saxbitning 7:or		Konsultation med foto eller modell, panorama.
	Övriga tandställningsfel och bettfel med subjektivt <u>och</u> objektivt behandlingsbehov enligt kriterier*. R2 grön.		Konsultation med foto eller modell, panorama.

Remiss till ortodontiavdelningen för fast apparatur förutsätter R2 grön. Om risk finns för skador på intilliggande permanenta tänder skickas remiss oavsett riskgrupp. Riskgruppering ska då anges i remissen.