

Iloprost (Ilomedin) 0,2 mikrogram/mL, Kirurgkliniken Jönköping

Komposition för infusion

Ilomedin 20 mikrogram/mL	2,5 mL
Natriumklorid 9 mg/mL	250 mL

Beredning

1. Dra upp 2,5 mL Ilomedin 20 mikrogram/mL i en 5 mL spruta.
2. Tillsätt till 250 mL infusionspåse med Natriumklorid 9 mg/mL.
3. Blanda noga. Koncentrationen Ilomedin i blandningen blir 0,2 mikrogram/mL.

Dosering

Ges som kontinuerlig infusion med infusionspump i max 6 timmar/dygn.

Starta med 9 mL/timme under 30 minuter.

Kontroll av puls, blodtryck, huvudvärk, flush, svettningar 15-30 minuter efter infusionsstarten.

Öka till 18 mL/timme efter 30 minuter.

Samma kontroller som tidigare. Minska dosen vid symptom enligt ovan.

Öka till 27 mL/timme efter 30-60 minuter.

Sänk dosen vid blodtrycksfall eller andra biverkningar.

Om det går bra, öka dosen till 36 mL/timme (=maxdos).

Kontroller enligt ovan.

När den flödes hastighet patienten tål har hittats ska patienten kvarstå den hastigheten dagligen under behandlingstiden.

Man kan ofta börja med den hastigheten direkt som patienten hade föregående dag.

[Kontroller utförs som tidigare.](#)

Observera

Varje patient får en individuell ordination.

Hållbarhet och förvaring

Hållbarhet efter beredning: I rumstemperatur 12 timmar. I kylskåp 24 timmar.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT