Ibuprofen
(Brufen, Ibumax, Ibumetin, Ibuprofen, Ipren, Iprensa)

Vad är ibuprofen?
Ibuprofen används för att lindra mild till måttlig smärta och inflammation. Ibuprofen verkar genom att minska kroppens bildning av ämnen som framkallar smärta och inflammation. Dessutom sänker Ibuprofen feber genom att påverka det område i hjärnan som reglerar temperaturen.

Hur tar jag ibuprofen?
Ta ibuprofen med lite vätska. Följ de anvisningar om dosering som du fått av din läkare. Då får du bästa möjliga resultat av behandlingen.

Ibuprofen kan tas regelbundet eller vid behov. Om du ska ta ibuprofen regelbundet ska de tas vid samma tider varje dag. Välj ett tillfälle som passar ihop med dina dagliga rutiner, då kommer du lättare ihåg att ta medicinen.

Om du har fått ibuprofen vid tillfällig smärta, till exempel efter en operation, så ska du minska dosen när smärtan minskar. Om du har fått läkemedel med paracetamol, exempelvis Alvedon eller Panodil, tillsammans med ibuprofen, så bör du minska dosen ibuprofen innan du minskar dosen paracetamol.

Om du glömt att ta din medicin bör du försöka ta den så fort som möjligt. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa tablett ska du inte ta någon extra.

Om jag tar andra läkemedel samtidigt
Vissa läkemedel bör inte användas tillsammans. Därför är det viktigt att du talar om för din läkare vilka andra läkemedel du tar. Berätta även om du använder receptfria mediciner eller naturläkemedel.

Biverkningar
De allra flesta får inga biverkningar men en del som använder ibuprofen kan få magbesvär som t ex illamående, ont i magen eller diarré. Läkemedlet kan öka risken för magsår och ge yrsel, huvudvärk eller hudutslag. Risken för biverkningar ökar vid höga doser, långa behandlingstider och med åldern.

Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta din läkare.

Kontakt
Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.