

## Vemurafenib (Zelboraf)

### Vad är Zelboraf?

Zelboraf är ett läkemedel som används för behandling av hudcancer, malignt melanom, då den spridit sig till andra delar av kroppen. Det verksamma ämnet i medicinen, vemurafenib, angriper cancercellerna och påverkar deras förmåga att växa.

### Hur tar man medicinen?

Den vanligaste dosen av Zelboraf är 4 tabletter två gånger dagligen med 12 timmars mellanrum (morgon och kväll). Zelboraf ska sväljas hela och sköljas ned med vatten. Tabletterna ska inte krossas, tuggas eller delas. Zelboraf ska helst tas tillsammans med måltid. Vid kräkning ska inte en extra dos tas. Behandlingen fortsätter som vanligt med nästa omgång tabletter.

### Vad är rätt dos för mig?

Din läkare bestämmer lämplig dos för dig. Din dosering kan behöva justeras under behandlingstiden. Det är viktigt att du inte på egen hand avbryter behandlingen. Samråd med din läkare om du är tveksam till fortsatt medicinering.

### Glömda doser

Om du glömt att ta Zelboraf bör du försöka ta den så fort som möjligt. Om nästa doseringstillfälle är inom 4 timmar ska den glömda dosen inte tas. Ta inte dubbel dos för att kompensera glömd dos. Vid frågor, kontakta din mottagning.

### Provtagning

Provtagning under behandlingen sker enligt läkarens ordination. Du får besked av din kontaktsjuksköterska när provtagning ska ske. Hjärtkontroller kommer utföras regelbundet.

Om du ska vaccinera dig (t.ex. mot influensan), be din kontaktsjuksköterska om råd.

### Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa mediciner bör inte användas samtidigt. Därför är det viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner inklusive receptfria mediciner eller naturläkemedel du använder.

### Biverkningar

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar. Zelboraf ger besvär av brännskador vid vistelse i solen. Information kring solskyddsfaktor och övriga skydd kommer att ges av din kontaktsjuksköterska. Utöver detta kan besvär av minskad aptit, smakrubbing, trötthet, feber, håravfall, led-och muskelsmärk, ryggsmärta, huvudvärk, hosta, diarré, kräkningar, illamående, förstoppning, hudutslag, torr hud, klåda och vätskeansamling/svullnad uppkomma. Vid misstanke om omfattande och/eller oacceptabla biverkningar bör du kontakta din läkare/kontaktsjuksköterska. Om du uppmärksammar hudförändringar är det viktigt att berätta det så fort som möjligt. Det är även viktigt att du rapporterar till din kontaktsjuksköterska eller läkare om du har tecken på infektion.

### Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.