

Adrenalin 0,01 mg/mL, OP Jönköping, lokal administrering

Komposition för lokal administrering

Adrenalin 1 mg/mL (OBS! Styrkan förvaras i kylskåp)	1 mL
Natriumklorid 9 mg/mL (injektionsflaska)	100 mL

Beredning

1. Dra upp 1mL Adrenalin 1 mg/mL i en spruta.
2. Tillsätt Adrenalin i en 100 mL injektionsflaska Natriumklorid 9 mg/mL.
3. Blanda noga. Koncentrationen Adrenalin i beredningen blir 0,01 mg/mL.

Dosering

Ordineras enligt särskild ordination. Läggs lokalt i operationsområdet.

Observera

Används för parotidektomi, submandibularis och även större körtlar.

Obs! Förväxlingsrisk med utspädd lösning (Adrenalin 0,1 mg/mL) finns.

Hållbarhet och förvaring

Förvaras i originalförpackningen i kylskåp. Ljuskänsligt.

Används direkt efter spädning.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län.

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT