

REKOMMENDATION – AVSTÅ

Regional samverkansgrupp läkemedel
Sydöstra sjukvårdsregionen

2025-10-07

Maralixibat (Livmarli)

Regional samverkansgrupp läkemedel rekommenderar att avstå från användning av maralixibat (Livmarli) för behandling av klåda orsakad av att gallsyror samlas i levern (gallstas) hos patienter med Alagilles syndrom.

Företaget har visat att Livmarli har en bättre effekt än det relevanta jämförelsealternativet som är inget tillägg till bästa understödjande vård. TLV har vid denna bedömning utgått ifrån att klåda orsakad av kolestas hos patienter med Alagilles syndrom är ett tillstånd med mycket hög svårighetsgrad. De väsentligt högre kostnaderna för Livmarli bedöms dock inte vara rimliga i förhållande till den nytta som behandlingen ger för ett mycket sällsynt tillstånd.

Inom ramen för möjligheten till överläggning, som ges i förmånslagen, har TLV haft trepartsöverläggningar med företaget och regionerna. Trepartsöverläggningarna har inte resulterat i något avtal mellan företaget och regionerna. Ansökan om subvention avslås därför.

Beslutet i sin helhet finns att läsa här: [Livmarli ingår inte i högkostnadsskyddet](#)

Bakgrund: Alagilles syndrom är ett ovanligt, ärftligt syndrom som kan påverka flera organ. Det är vanligt att personer med syndromet har kronisk leversjukdom med gulsot och besvärande klåda till följd av att gallsyror samlas i levern, även kallat gallstas.

Livmarli innehåller den aktiva substansen maralixibat som minskar återupptaget av gallsyror från tarmen till levern och ökar utsöndringen av gallsyror via tjocktarmen. På så vis minskar koncentrationen av gallsyror i blodet. Livmarli klassas som ett särlekemedel.

TLV beslutade i september 2025 att Livmarli inte ska ingå i förmånen.