

Antitrombin III (Antitrombin III Baxalta, Atenativ) 50 E/mL, OP/IVA, Region Jönköpings län

Komposition för sprutpump / injektion

Antitrombin III 1000 E (pulver)	1 st
Bifogat spädningsmedel (sterilt vatten)	20 mL

Beredning för Antitrombin III Baxalta

1. Låt värmas upp till rumstemperatur eller kroppstemperatur.
2. Tag av skyddet från den ena nålen på överföringskanylen (den med rosa hylsa) genom att vrida och dra, och stick in nålen genom gummiproppen på flaskan med spädningsmedel.
3. Tag av skyddet från den andra sidan av nålen på överföringskanylen (den med rosa hylsa) och vänd flaskan med vatten upp och ner, och för in i den fria nålen till hälften i gummiproppen på flaskan med pulver. Vattnet sugas in i flaskan med pulver genom vakuum.
4. Tag bort den tomma flaskan med vatten tillsammans med överföringskanylen. Snurra flaskan försiktigt tills pulvret löst sig. Skaka inte.
5. När pulvret är upplöst, stick in den medföljande luftningskanylen (vit/transparent kanyl som finns i TripleSet-förpackningen) så att eventuellt skum försvinner och trycket i flaskan utjämnas. Tag sedan bort luftningskanylen.
6. Dra upp lösningen med en 50 mL-spruta avsedd för sprutpump och med hjälp av medföljande filterkanyl (grov, kort kanyl).
7. Koncentrationen Antitrombin III i beredningen blir 50 E/mL.

Dosering

Individuell dosering efter antitrombinvärde.

Infusionshastigheten bör ej överstiga 100 E/minut (= 2 mL/min = 120 mL/h).

Hållbarhet och förvaring

Förvaras i kylskåp i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Färdigberedd lösning ska användas inom 12 timmar. Färdigberedd lösning förvaras i kylskåp.

För aktuell lagerhållning se SVEPA.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT