

## Biperiden (Akineton) 5 mg/mL, ANTIDOT, Region Jönköpings Län

ANTIDOT - OBS! Ges i samråd med Giftinformationscentralen (GIC).

För behandling av extrapyramidala symtom vid överdosering med vissa neuroleptika

### Komposition för injektion

Akineton (biperiden) 5 mg/mL	Ordinerad mängd
------------------------------	-----------------

### Beredning

1. Dra upp ordinerad mängd i 1-mL-spruta för att underlätta långsam intravenös administrering.

### Dosering

Dosering i samråd med GIC.

### Vuxna

**Standarddos:** 0,5-1 mL (=2,5–5 mg) ges långsamt intravenöst. Kan vid behov upprepas efter 30 min.

### Barn

**Standarddos:** 0,04 mg/kg (=0,008mL/kg) ges långsamt intravenöst. Kan vid behov upprepas efter 30 min.

### Hållbarhet och förvaring

Används direkt.

Hållbarhet efter beredning: I rumstemperatur 12 timmar, i kylskåp 24 timmar.

För lagerhållning, se SVEPA.

### Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**