

Oxikodon depot/Oxikodon **(Långverkande: Oxikodon Depot, Oxycodone Depot, OxyContin** **Kortverkande: Oxikodon, Oxycodone, OxyNorm)**

Vad är Oxikodon Depot/Oxikodon?

Oxikodon Depot/Oxikodon innehåller det morfinliknande ämnet oxikodon och används vid långvarig och svår smärta. Det är ett kraftigt smärtstillande läkemedel som verkar genom att dämpa smärtimpulserna till hjärnan. Läkemedlet påverkar också upplevelsen av smärta, så att det onda inte känns lika obehagligt.

Hur tar jag läkemedlet?

Ta läkemedlet tillsammans med vätska. Följ de anvisningar om dosering som du fått av din läkare. **Oxikodon** är snabbverkande och kan tas vid behov eller regelbundet. **Oxikodon Depot** är en långverkande depottablett och ska sväljas hela. Om du ska ta Oxikodon Depot/Oxikodon regelbundet ska de tas vid samma tider varje dag. Välj tider som passar ihop med dina dagliga rutiner. Om du fått läkemedlet mot tillfällig smärta, till exempel efter en operation, ska du minska dosen när smärtan minskar. Om du har fått läkemedel i kombination med paracetamol, ex Alvedon eller Panodil, bör du minska dosen Oxikodon Depot/Oxikodon innan du minskar dosen paracetamol. Utsättningsbesvär kan förekomma om behandlingen avslutas tvärt. Vid behandling i mer än en vecka ska dosen minskas i samråd med din läkare. Om du glömt att ta läkemedlet bör du ta den så fort som möjligt. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa dos ska du inte ta någon extra. Om man tar Oxikodon Depot/Oxikodon tillsammans med alkohol ökar risken för andningsproblem och medvetandesänkning. Kombinera därför inte

medicinen med alkohol utan att först rådgöra med din läkare.

Om jag tar andra mediciner samtidigt

Vissa läkemedel bör inte kombineras. Tala därför om för din läkare vilka läkemedel du använder, även receptfria läkemedel eller naturläkemedel.

Biverkningar

Läkemedel har i första hand positiva effekter men ibland kan de ge biverkningar. Oxikodon Depot/Oxikodon kan ge trötthet, illamående eller kräkningar. Dessa biverkningar är vanligast i början av behandlingen och försvinner oftast vid fortsatt användning. Läkemedlet kan också orsaka förstoppning. Detta kan förebyggas med till exempel katrinplommon eller hela linfrön tillsammans med rikligt vätskeintag. Läkemedel som förebygger förstoppning är t.ex. Laktulos eller Movicol. Vid svårare förstoppning kan man även använda t.ex. Cilaxoral. Muntorrhet är vanligt, vilket ökar risken för hål i tänderna. Detta kan förebyggas med fluortillskott eller receptfria salivstimulerande medel. Eftersom körförmågan kan påverkas är det viktigt att du själv bedömer om du är tillräckligt alert för bilkörning. Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta din läkare.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se. Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.