

Råd till patienter om insulin dagen innan operation samt på operationsdagens morgon

Basinsulin:

(Humulin NPH, Abasaglar, Toujeo, Lantus, Tresiba, Xultophy, Suliqua eller Awiqli)

Patienten uppmanas att ta sitt basinsulin som vanligt, d.v.s. inga uppehåll eller dosminskningar inför operationen.

Snabbverkande måltidsinsulin:

(Apidra, Fiasp, Insulin lispro, Insulin aspart, Humalog, Humulin Regular eller Novorapid)

Tar patienten INTE på OP-dagens morgon.

Undantag: Om patienten måste opereras på eftermiddagen får patienten äta vanlig frukost (inklusive måltidsinsulin) om frukosten intas minst 6 timmar innan operationstiden.

Mixinsulin:

(Humalog Mix eller Novomix)

Patienten uppmanas att ta sitt blandinsulin som vanligt kvällen innan operationen men hoppa över OP-dagens morgon.

Insulinpump:

Patienten låter insulinpumpen sitta kvar men uppmanas att INTE ta någon bolusdos på morgonen.

Vid insulinkänning under fasta inför OP – patienten uppmanas dricka något sött klar dryck.

Vid ankomst till OP-avdelning:

Blodsockret kontrolleras (patienten berättar hur han/hon tagit sitt insulin senaste 12-24 timmarna).