

REKOMMENDATION - AVSTÅ

Regional samverkansgrupp läkemedel
Sydöstra sjukvårdsregionen

2025-01-21

Daridorexant (QUVIVIQ)

Regional samverkansgrupp läkemedel rekommenderar att avstå från användning av daridorexant (QUVIVIQ) vid insomni.

TLV bedömer att svårighetsgraden för kronisk insomni på gruppnivå är låg mot bakgrund av att tillståndet i första hand har en koppling till försämrad livskvalitet och inte tillräckligt visad livslängdspåverkan. TLV:s hälsoekonomiska analyser visar att kostnaden för behandling med Quviviq är högre än vad TLV vanligtvis accepterar för tillstånd med låg svårighetsgrad. TLV har därför avslagit företaget ansökan om subvention.

Beslutet i sin helhet finns att läsa här: [Quviviq ingår inte i högkostnadsskyddet - Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV](#)

Bakgrund: Quviviq är avsett för behandling av vuxna med insomni sedan minst tre månader där symtomen har en betydande påverkan på funktionsnivån dagtid. Läkemedlet innehåller den aktiva substansen daridorexant som är en blockerare av orexinreceptorerna orexin-1 och orexin-2. Orexinsystemet reglerar sömn-vakenhet och hos individer med insomni ses överaktiva vakenhetssignaler. Genom att blockera orexinreceptorerna hämmar daridorexant vakenhetssignalerna, vilket främjar sömn.

TLV beslutade i december 2024 att QUVIVIQ inte ska ingå i förmånen.