

Val av kemiska medel vid städning av smittor på korttidsenhet och särskilt boende

	Regelmässig städning		Slutstädning		Punktdesinfektion
	Tagytor	-dagligen Golv-egen rutin	Tagytor	Golv	vid spill av kroppsvätskor
Vinterkräksjuka (noro, sapovirus)	Virkon 1%*	Normal rengöring	Virkon 1%*	Normal rengöring	Virkon 1%*
Clostridioides difficile (CDI)	Oxivir <u>Sporicide</u> ** alt. klorinlösning ***	Normal rengöring	Oxivir <u>Sporicide</u> ** alt. Klorinlösning ***	Normal rengöring	Oxivir <u>Sporicide</u> ** alt. Klorinlösning ***
Influensa, RS-virus och Covid-19	Ytdesinfektion	Normal rengöring	Ytdesinfektion	Normal rengöring	Ytdesinfektion
MRSA och ESBL <u>med</u> riskfaktor och ESBL-carba,	Ytdesinfektion	Normal rengöring	Ytdesinfektion	Normal rengöring	Ytdesinfektion
VRE	Ytdesinfektion	Normal rengöring	Virkon 1%* Vid VRE gnugga alla ytor med rengöringsmedel och vatten först en gång. Sedan städas allt med Virkon en andra gång.	Virkon 1%*	Ytdesinfektion

Förklaringar:

Normal rengöring:

Till golv används moppar som prepareras med rengöringsmedel.

Moppar/dukar vid smitta:

Till övriga ytor används rena, fuktiga mikrofiberdukar. Vid synlig smuts prepareras dessa med rengöringsmedel och vatten.

När särskilda desinfektionsmedel används gäller städdukar och moppar som **inte** är preparerade med rengöringsmedel.

Engångsmaterial är ett bra alternativ.

Tagytor:

Ex. säng, sängbord, dörrhandtag, larm, spolknopp, handfat, kranar, duschhandtag, medicinteknisk utrustning och olika hjälpmedel.

Ytdesinfektion

Alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid. Lämpligt medel är isopropanol ca 45 volymprocent innehållande tensid. Bearbeta

ytan mekaniskt. Inverkningstid tills medlet har torkat in.

***Virkonlösning:**

En tablett löses i 0,5 liter ljummet vatten i för medlet avsedd flaska. Blandad Virkonlösning är hållbar i **5 dygn**. Inverkningstid **10 minuter**.

****Oxivir Sporicide Wipe:**

Kombinerad rengörings- och desinfektionsduk. Färdig att användas. Öppnad förpackning är hållbar **2 år**. Inverkningstid **5 minuter**.

***** Klorinlösning**

En del klorin späds i nio delar vatten. Spädningen är hållbar i **24 timmar**. Inverkningstid **10 minuter**. Synligt smutsiga ytor måste rengöras med rengöringsmedel och vatten innan klorinlösning används.

Flaskor med olika rengöring- och desinfektionsmedel ska desinfekteras på utsidan efter användning liksom använd städutrustning!

Vid frågor kontakta Smittskydd Vårdhygien telefon 010-2425719 smittskydd.vardhygien@rjl.se