

1. Vilket medel används vid desinfektion på ett undersökningsrum där en patient med vinterkräxjukan (calici) har vårdats?

- 1. Spordödande medel
- X. Virkon
- 2. Vanlig ytdesinfektion

2. Du ska ta vitala parametrar på en patient med diarréer, vilken skyddsutrustning har du på dig?

1. Alltid långärmat förkläde, handskar, munskydd och visir

X. Inget särskilt, jag blir aldrig sjuk

2. Beror på om risk för nedsmutsning/kontakt med kroppsvätskor föreligger. Gör en individuell bedömning

3. Hur länge bedöms en patient vara smittsam efter en infektion med calici?

- 1. Tills hen är negativ i prov
- X. 48 timmar efter sista diarré/kräkning
- 2. 24 timmar efter sista diarré/kräkning

4. Vid vilka tillfällen används munskydd och visir vid vård av patient med calici?

1. Alltid när du går in på patientrummet. Viruspartiklar kan finnas kvar i luften

X. Endast vid omhändertagande av diarréer och kräkning

2. Endast vid omhändertagande av diarréer och kräkning samt på patient vid transport

5. Vad är viktigast att tänka på vid städning av ett undersökningsrum där en patient med misstänkt/bekräftad clostridioides har vistats?

1. Att dränka alla ytor med spordödande medel
- X. Att låta undersökningsrummet stå tomt en timma efter städning så att sporererna dör
2. Att mekaniskt gnugga och gno med spordödande medel på ytor med hög smittrisk

6. Vid vilka situationer ska man tvätta händerna med tvål och vatten?

1. Om händerna är synligt smutsiga eller känns smutsiga, och alltid vid kontakt med patient som har kräkningar och/eller diarréer

X. När du inte vill sprita händerna för att du har ett sår på fingret

2. Alltid före handdesinfektion

7. Hur sprids calici?

1. Luftburen smitta

X. Droppsmitta och direkt eller indirekt kontaktsmitta

2. Genom huden, ha alltid handskar på dig vid kontakt med patient med calici

8. Du har själv haft calici, men har nu frisknat till. När är det okej att gå tillbaka till jobbet?

1. Efter 24 timmars symtomfrihet. Du får dock inte hantera oförpackade livsmedel förrän efter 48 timmar
- X. Efter 48 timmars symtomfrihet
2. Så fort du känner dig pigg nog att arbeta

9. Vad är sant angående handdesinfektion efter undersökning av en patient med clostridioides och calici?

1. Handskar skyddar mot calici och clostridioides och händerna behöver inte spritas efteråt

X. Clostridioides och calici avdödas inte av handsprit och därför måste handtvätt med tvål och vatten utföras innan handdesinfektion, även när handskar har använts

2. Clostridioides och calici avdödas av handsprit men eftersom vi glömmer att sprita händerna ibland är det lätt att de sprids i vårdmiljön

10. När ska handskar användas vid kontakt med patient som har misstänkt tarmsmitta?

1. Ta på handskarna innan du går in till patienten för att skydda dig
- X. När jag ska röra patienten
2. När det finns risk för kontakt med kroppsvätskor