

Iloprost (Ventavis) 5 mikrogram/mL, för inhalation, OP/IVA, Region Jönköpings län

Komposition för INHALATION

Iloprost (Ventavis) 10 mikrogram/mL	4 mL
Natriumklorid 9 mg/mL	4 mL

Beredning

1. Dra upp 4 mL Natriumklorid 9 mg/mL i en 10 mL-spruta alternativt i en spruta avsedd för kontinuerlig inhalation.
2. Tillsätt 4 mL Iloprost 10 mikrogram/mL.
3. Blanda noga. Koncentrationen Iloprost i beredningen blir 5 mikrogram/mL (0,005 mg/mL).

Dosering

Se arbetsbeskrivning ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome).

Standarddos kontinuerlig behandling: 2,5 mikrogram/h (= 0,5 mL/h)

Standarddos intermittent behandling: 2,5 - 15 mikrogram (= 0,5 - 3 mL). Späd ordinerad dos med Natriumklorid 9 mg/mL till totalvolym 2 mL. Inhalationen ges under 15 - 30 minuter.

Iloprost 5 mikrogram/mL (mL)	Natriumklorid 9 mg/mL (mL)
0,5	1,5
1	1
1,5	0,5
2	0

Observera

Vid kontinuerlig inhalation skall filtret vid utandningsslangen bytas var 12:e timme.

Ska inte inhaleras samtidigt som andra inhalationsläkemedel. Kontrollera med jämna mellanrum att inte läkemedel kvarstannar i nebulisatorkammaren.

Läkemedlet hanteras efter Riktlinjer för hantering av läkemedel med risk för toxisk effekt.

Hållbarhet och förvaring

Färdigberedd lösning är stabil under 24 timmar i rumstemperatur.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län.

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT