

Dihydralazin (Nepresol) infusion 0,025 mg/mL kvinnoklinikerna, Region Jönköpings län

Komposition för volympump

Dihydralazin 25 mg (pulver)	1 st
Bifogad spädningsvätska (sterilt vatten)	2 mL
Natriumklorid 9 mg/mL (infusionspåse)	1000 mL

Beredning

1. Tillsätt 2 mL bifogad spädningsvätska till pulver Dihydralazin. Blanda.
2. Koncentrationen Dihydralazin i stamlösningen blir 12,5 mg/mL.
3. Dra upp stamlösningen ur flaskan och tillsätt den till 1000 mL infusionspåse Natriumklorid 9 mg/mL. Blanda. Koncentrationen Dihydralazin i beredningen blir 0,025 mg/mL.

Infusionspåsen har en överfyllnad på max 10 %. Koncentrationen blir därför inte exakt.

Dosering

Startdos: 0,5 mg/h = 20 mL/h.

Doseringen anpassas efter kliniskt svar. Kan höjas med 10 mL/h var 30:e minut till maximal hastighet på 60 mL/h.

Observera

Licensläkemedel

Hållbarhet och förvaring

Förvara ampullerna i yttkartongen. Ljuskänsligt.

Hållbarhet efter beredning: 24 timmar i rumstemperatur.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, barnmorskor/sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län (MW, SA, AH)