

Zoledronsyra (Aclasta, Zerlinda, Zoledronic acid, Zoledronsyra, Zolestad, Zometa)

Zoledronsyra palliativt vid bröstcancer

Vad är zoledronsyra?

Zoledronsyra är ett läkemedel med skelettstärkande effekt som normalt ges till patienter med skelettmetastaser. Zoledronsyra har också visat sig ge effekt i ett palliativt syfte vid bröstcancer, förutsatt att inga kontraindikationer mot behandlingen föreligger.

Hur tar man medicinen?

Zoledronsyra ges på mottagning som intravenös infusion (dropp) under ca 20 minuter 1 gång var 3:e-4:e vecka. Provtagning för kontroll av njurfunktion och kalkvärden görs före varje behandling. I vissa fall kompletteras behandlingen med kalk- och D-vitamintillskott t.ex. i form av daglig tablettbehandling.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa mediciner bör inte användas tillsammans. Därför är det viktigt att du talar om vilka andra mediciner du tar. Berätta även om du använder receptfria mediciner eller naturläkemedel.

Biverkningar

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar. De allra flesta får inga biverkningar men en del som använder zoledronsyra kan uppleva övergående feberstegring och muskel- och ledsmärtor den första infusionen. Dessa biverkningar är mycket sällsynta i samband med de senare behandlinggångerna.

I sällsynta fall finns risk för skador på käkbenet. Zoledronsyra kan också orsaka försämrad läkning om en tand behöver tas bort i framtiden. Då effekten av zoledronsyra kvarstår efter utsättning är det därför viktigt att du alltid berättar för din tandläkare och tandhygienist att du behandlas eller har behandlats med zoledronsyra. Munhygien är mycket viktigt för att förebygga tandproblem. Följ noga de råd du får av din tandläkare och tandhygienist.

Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta din läkare.

Vid frågor kontakta Onkologklinikens dagvård vardagar mellan 8.00–9.30 eller 13.00–16.00 på telefon 010-242 29 19.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.

✂..... ✂

Klipp av och lämna till din tandläkare vid nästa besök.

Information till vederbörande tandläkare

Aktuell patient har ordinerats Zoledronsyra 4 mg var 6:e månad i 3 år (6 behandlingar). Behandlingen ges för att minska risk för återfall i bröstcancer. Risken för osteonekrosutveckling i käkarna vid obehandlade infektioner eller illasittande oralprotetiska konstruktioner torde vara avsevärt lägre än vid dosering var 3-4:e vecka. För att vara på den säkra sidan rekommenderas dock patienterna att kontakta ordinarie tandläkare för en undersökning vid besvär från tänderna/käkarna.

Undersökningen bör innehålla:

- Klinisk och radiologisk undersökning
- Särskild utredning av tänder med infektion/ risk att utveckla infektion
- Behandling av apikal parodontit, parodontit, karies och ev. andra tandsjukdomar
- Eventuell justering av befintliga avtagbara protetiska konstruktioner
- Regelbunden undersökning, profylax och uppmaning till god egenvård

/Onkologkliniken och Sjukhustandvården,
Länssjukhuset Ryhov