


Evidens för uppresningsbygel Eva

En enkät skickades ut till 207 hjälpmedelsförskrivare inom Jönköpings län som under perioden februari 2016 till april 2018 förskrivit uppresningsbygel Eva. 134 förskrivare har besvarat enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 64,7 %. 50 % av förskrivarna har gjort fler än 10 förskrivningar.

- Merparten av förskrivningarna har gjorts till patienter med allmän svaghet följt av balanssvårigheter samt till patienter inskrivna i palliativ vård. Flera förskrivare har när möjlighet till kommentarer ges påtalat att de inte förskriver hjälpmedel utifrån diagnos utan funktionsnedsättningen styr valet av hjälpmedel.

Vid vilket problem förskriver du Uppresning Eva med bygel från Swereco. Du kan ange flera alternativ.

Namn	Antal	%
Allmän svaghet	114	85,1
Svaghet på grund av KOL	29	21,6
Svaghet på grund av hjärtproblematik	38	28,4
Balanssvårighet	84	62,7
Balanssvårighet/svaghet på grund av neurologisk sjukdom	64	47,8
Balanssvårighet/svaghet till följd av stroke	85	63,4
Kognitiv svikt, t ex demens	17	12,7
Palliativ vård	43	32,1
Amputation	18	13,4
Annat:	36	26,9
Total	528	394




Svarsfrekvens
100% (134/134)

- Det vanligaste målet för förskrivning av uppresningsbygel Eva är överflyttning i och ur säng. Följt av att kunna vända sig i sängen eller annan lägesförändring.

Vilka mål är de vanligaste när du förskriver Uppresning Eva med bygel? Ange max tre mål.

Namn	Antal	%
Skydd för att inte rulla ur sängen	26	19,4
Vända sig i säng eller annan lägesändring i sängen	83	61,9
Överflyttning i och ur säng	115	85,8
Uppresning vid säng t ex från sittande på sängkanten, i rullstolen eller likande	104	77,6
Annat mål:	5	3,7
Total	333	249,5




Svarsfrekvens
100% (134/134)

- Att patienten självständigt ska kunna utföra en aktivitet var syftet med förskrivning i 91 % av fallen.
- De flesta patienterna, 99,3%, hade nytta av sitt uppresningsstöd varje dag eller flera gånger varje dag.
- Flertalet av patienterna, 87,2%, hade nytta av sitt hjälpmedel under lång tid (mer än tre månader).
- Den risk som flest förskrivare noterat var att det fanns klämrisk vid kombination med reglerbar säng. Några förskrivare påtalade också att det kan finnas ett riskmoment om uppresningsbygeln flyttas på sänggramen, men de flesta förskrivarna noterade ingen risk.

Har du upplevt att det finns några risker med användningen av Uppresning Eva med bygel?

Namn	Antal	%
Fall/snubbelrisk för patient	19	14,2
Fall/snubbelrisk för andra personer	6	4,5
Klämrisk för patient	9	6,7
Klämrisk vid montering för den som monterar	8	6
Klämrisk vid kombination med reglerbar säng	32	23,9
Klämrisk när två Uppresning Eva monterar på samma sida	0	0
Annat:	30	22,4
Nej, det finns ingen risk	56	41,8
Total	160	119,4




Svarsfrekvens
100% (134/134)

- 16,4 % av förskrivarna tyckte att det var svårt eller ganska svårt att bedöma om sänggramen var lämplig.

- Bedöma om sängens träram är lämplig

Namn	Antal	%
Mycket lätt	26	19,4
Lätt	86	64,2
Ganska svårt	21	15,7
Svårt	1	0,7
Total	134	100




Svarsfrekvens
100% (134/134)

- 92,6 % av förskrivarna bedömde det som lätt eller mycket lätt att bedöma den sammantagna risken vid användning av upprensingsbygel Eva.

- Bedöma den sammantagna risken vid användning

Namn	Antal	%
Mycket lätt	21	15,7
Lätt	103	76,9
Ganska svårt	10	7,5
Svårt	0	0
Total	134	100

Svarsfrekvens
100% (134/134)




- Störst effekt visade sig upprensingsbygel Eva har på problemet överflyttning i och ur säng där förskrivarna uppgett att 93,3 % av patienterna med problemet har mycket stor effekt eller stor effekt av upprensingsbygel Eva.

- Överflyttning i och ur säng

Namn	Antal	%
Mycket stor effekt	63	47
Stor effekt	62	46,3
Måttlig effekt	2	1,5
Liten effekt	0	0
Ingen effekt	0	0
Aldrig förskrivit i detta syfte	7	5,2
Total	134	100

Svarsfrekvens
100% (134/134)




- Även vid problemet uppresning från sittande uppger förskrivarna att patienterna har god nytta av uppresningsbygel Eva. 88,1% av patienterna har haft mycket stor eller stor effekt på problemet.

- Uppresning vid säng t ex från sittande på sängkanten, i rullstolen eller likande

Namn	Antal	%
Mycket stor effekt	54	40,3
Stor effekt	64	47,8
Måttlig effekt	10	7,5
Liten effekt	1	0,7
Ingen effekt	0	0
Aldrig förskrivit i detta syfte	5	3,7
Total	134	100

Svarsfrekvens
100% (134/134)



- Vid vändning i säng eller annan lägesförändring gav uppresningsbygel Eva stor effekt på problemet för 55,4% av patienterna.

- Vända sig i säng eller annan lägesändring i sängen

Namn	Antal	%
Mycket stor effekt	21	15,7
Stor effekt	73	54,5
Måttlig effekt	27	20,1
Liten effekt	5	3,7
Ingen effekt	1	0,7
Aldrig förskrivit i detta syfte	7	5,2
Total	134	100

Svarsfrekvens
100% (134/134)

