

Desloratadin (Aerius, Dasselta, Desloratadin, Desloratadine, Flynnise)

Vad är desloratadin?

Läkemedel som innehåller desloratadin används vid allergiska tillstånd. Medicinen kan också användas i förebyggande syfte när det finns skäl, på grund av tidigare allergisk reaktion, inför undersökning med röntgenkontrastmedel som sprutas i blodet.

Hur ska jag ta läkemedlet

Du ska ta tabletterna med lite vätska.

2 tabletter a 5 mg tas 12 timmar innan undersökningstiden, ytterligare 2 tabletter a 5 mg tas 2 timmar innan kontrastmedelsinjektionen (undersökningstiden).

Viktigt

Det är ovanligt att medicinen påverkar förmågan att köra bil eller hantera maskiner. Enstaka personer kan bli dåsiga av medicinen och man måste själv känna efter hur man reagerar. Man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver full uppmärksamhet.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.