

## Efedrin 5 mg/mL, OP/IVA Region Jönköping län

### Komposition

Efedrin 50 mg/mL	1 mL
Natriumklorid 9 mg/mL	9 mL

### Beredning

1. Dra upp 9 mL Natriumklorid 9 mg/mL i en 10 mL spruta.
2. Dra därefter upp 1 mL Efedrin 50 mg/mL i samma 10 mL-spruta.
3. Blanda noga. Koncentrationen Efedrin i beredningen blir 5 mg/mL.

**Vuxen:** den färdiga beredningen med Efedrin 5 mg/mL kan delas upp i två 10 mL-sprutor med 25 mg (= 5 mL) i vardera spruta för att användas till flera patienter.

**Barn:** den färdiga beredningen Efedrin 5 mg/mL dras upp i en 1 mL spruta.

### Dosering

**Dos vuxna:** 5-10 mg intravenöst, dosen kan upprepas.

**Dos barn:** 0,1 (-0,5) mg/kg. Max 10 mg.

### Hållbarhet och förvaring

Hållbarhet efter beredning: i rumstemperatur 24 timmar.

### Observera

Efedrin finns även som färdig lösning på 5 mg/mL.

### Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län.

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**