

Till dig som får behandling som kan ge illamående (hög, BEP, EP)

Ta läkemedel för att förbygga illamående enligt följande:

Dag 1 1 timme före behandling:

- Akynzeo 300 mg/0,5 mg 1 kapsel
- Betametason 0,5 mg 16 tabletter

Dag 2 1 timme före behandling:

- T. Betametason 0,5 mg 16 tabletter

Dag 3 1 timme före behandling:

- Akynzeo 300 mg/0,5 mg 1 kapsel
- T. Betametason 0,5 mg 16 tabletter

Dag 4 1 timme före behandling:

- T. Betametason 0,5 mg 16 tabletter

Dag 5 1 timme före behandling:

- Akynzeo 300 mg/0,5 mg 1 kapsel
- T. Betametason 0,5 mg 16 tabletter

Vid behov

- Olanzapin 2,5 mg 1 tablett max fyra gånger per dygn.

Akynzeo kan ge förstoppning. Förebygg med laxermedel.

Information om läkemedel mot illamående

Du kan få läkemedlen av din sjuksköterska eller på recept.

Akynzeo (netupitant/ palonosetron)

Akynzeo (netupitant/ palonosetron) är en kombinerad behandling i en kapsel. Du får med dig kapseln att ta hemma. Dosen tas minst en timma före behandling. Effekten håller i sig i tre dygn. Det är vanligt att få förstoppning. Detta kan förebyggas med laxermedel. Informera vårdpersonalen före behandlingen om du har trög mage. Vanligt med huvudvärk. Detta kan behandlas med paracetamol. Yrsel och trötthet kan förekomma. Tänk på det om du ska köra bil.

Betapred

Betapred (betametason) är kortison. Tabletterna löses i lite vatten och lösningen sväljs. Dosen tas minst en timma före behandling. Skölj gärna munnen med vatten efter intag av betametason för att minska risken för munsvamp. Ta tabletterna tillsammans med mat. Kortison används också för att minska risken för allergiska reaktioner som vissa cancerläkemedel kan ge. Kortison kan vara uppiggande och ge ansiktsrodnad.

Olanzapin

Olanzapin är ett läkemedel som används vid psykisk ohälsa men i låga doser har god effekt mot illamående, särskilt mot illamående som kan uppkomma dagar efter behandling. Du kan bli trött av Olanzapin. Tröttheten kan minska uppmärksamhet vid tex bilkörning vilket kan göra det olämpligt att framföra motorfordon. Vi rekommenderar att ta dosen på kvällen, med första dos behandlingsdagens kväll. Man ska ta högst 10 mg Olanzapin under en dag. Högre dos ger inte bättre effekt.

Illamåendedagbok

Namn..... Behandling.....

Registrera ditt mående och återkoppla till din sjuksköterska

Datum dag 1:		Illamående			Kräkning		Matleda		Upplevt välbefinnande			Anteckningar
		Inget	Lätt	Starkt	Ja	Nej	Ja	Nej	Bra	Dåligt	Mycket dåligt	
		Dag 1	Kväll									
Dag 2	Morgon											
	Dag											
	Kväll											
Dag 3	Morgon											
	Dag											
	Kväll											
	Morgon											
	Dag											
	Kväll											
	Morgon											
	Dag											
	Kväll											