


Hantering av smittsamma patienter - tandvård

Smittskydd Vårdhygien
Folktandvårdens hygienteam
2025


Smittsamma luftvägsinfektioner

- Virus som influensa, covid-19 och RS samt bakteriella infektioner som mykoplasma och kikhosta
- Smittar via små droppar som sprids från luftvägarna. Även kontaktsmitta via händer, ytor och föremål är möjliga smittvägar
- Om en patient har misstänkt smittsam luftvägsinfektion ska nytt vårdbesök bokas. Om patienten har akut behov följ dessa åtgärder:
 - direkt in på behandlingsrum, ska inte vänta i gemensamma utrymmen
 - följ BHK, använd skvättis, visir/skyddsglasögon och andningsskydd



Influensa

Foto: CDC
[About Influenza](#) | [Influenza \(Flu\)](#) | CDC



Covid-19

Foto: CDC
[About COVID-19](#) | [COVID-19](#) | CDC



eller




Smittskydd Vårdhygien, Folktandvårdens
hygienslag 2025

Magsjuka

- Calici dör inte av handsprit och ytdesinfektion
 - vid magsjuka: tvätta alltid händerna med tvål och vatten sen handsprit
- Hantering av pågående kräkning/diarré:
 - långärmat förkläde, handskar, munskydd, skyddsglasögon/visir
- Städning:
 - handskar och förkläde (kortärmat/långärmat efter riskbedömning)
 - städdukar och moppar av engångstyp
 - Virkon eller Oxivir Excel (servett/ skumspray) på ytor
 - desinfektera städutrustningen efter städning

Calici

Foto: CDC
[Laboratory Testing for Norovirus](#) | [Norovirus](#) | CDC



Sår i huvud-halsregionen på patient

Om patienten har ett sår på huvud eller hals följ dessa åtgärder:

- skydda om möjligt såret med förband
- följ basala hygienrutiner
- engångsplastförkläde med långa ärmar - endast vid vätskande sår där kontakt med personalens underarmar inte kan undvikas

Blåsor

När en patient har **vattkoppor eller bältros med generell utbredning** (vilket är luftburet) bör vårdbesöket bokas om möjligt.

- **Om patienten har akut behov följ dessa åtgärder:**
 - ring gärna Vårdhygien
 - direkt in på behandlingsrum, ska inte vänta i gemensamma utrymmen
 - försök boka vårdbesök sist på dagen, risk för smitta kan kvarstå i upp till 2 timmar efter att patienten lämnat rummet. Ju bättre ventilation desto snabbare upprening. Kan rummet vädras efter avslutad behandling påskyndar det också uppreningen.
 - patienten tas om hand av personal som är immun mot smittan (tidigare haft vattkoppor)
 - följ BHK och använd skvättis. Använd munskydd och visir/skyddsglasögon vid risk för skvätt mot ansiktet

Vattkoppor

Foto: CDC
[Photos of Chickenpox |](#)
[Chickenpox \(Varicella\) |](#)
[CDC](#)



Bältros

Foto: CDC
[Photos of Shingles |](#)
[Shingles \(Herpes](#)
[Zoster\) | CDC](#)



Blodsmitta

- Överföring av blodsmitta till personal är mycket ovanligt
- Till de viktigaste blodburna smittämnen hör hepatit B, hepatit C samt hiv
- Blodsmitta kan överföras till vårdpersonal genom stick- eller skärskador eller genom att blod eller blodtillblandade kroppsvätskor kommer i kontakt med en oskyddad slemhinna (t.ex. ögon eller mun) eller skadad hud
- Blod och blodtillblandade kroppsvätskor ska alltid hanteras som om de kan vara smittsamma. Oavsett om en person har en känd blodsmitta eller inte ska alltså samma vårdhygieniska rutiner tillämpas