

Prednisolon

Vad är prednisolon?

Prednisolon används som behandling vid många olika sjukdomar och tillstånd. Medicinen hör till gruppen glukokortikoider, i dagligt tal kortison, och har en kraftigt inflammationsdämpande verkan. Den påverkar också immunförsvaret.

Prednisolon kan också användas inför undersökning med röntgenkontrastmedel som sprutas in i blodet om det finns skäl, på grund av tidigare allergisk reaktion.

Hur ska jag ta läkemedlet

Du ska ta tablettorna med vätska, var noga med att skölja ner dem ordentligt.

5 tabletter a 10 mg tas 12 timmar innan undersökningstiden, ytterligare 5 tabletter a 10 mg tas 2 timmar innan kontrastmedelsinjektionen (undersökningstiden).

Biverkningar

De flesta biverkningar av prednisolon kommer efter långtidsanvändning och kommer inte hända när man bara tar läkemedlet vid två tillfällen.

Prednisolon kan göra att man blir överaktiv och får svårt att sova. Om man har diabetes kan blodsockernivåerna påverkas av att man tar prednisolon, därför kan det vara bra att göra tätare kontroller av blodsockret under dagen som man använder prednisolon, samt dagen efter.

Viktigt

Om du har astma, ta med din/a inhalator/er till undersökningen.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.