

Fomepizol (Fomepizole) 5 mg/mL, OP/IVA, Region Jönköpings län

ANTIDOT vid akut etylenglykolintoxikation

Komposition för sprutpump

Fomepizol 5 mg/mL	Ordinerad mängd
-------------------	-----------------

Beredning

1. Dra upp ordinerad mängd Fomepizol 5 mg/mL i 50 mL-sprutor avsedd för sprutpump.
2. Koncentrationen Fomepizol är 5 mg/mL.

Dosering

Laddningsdos: 15 mg/kg som långsam intravenös infusion på 30 minuter.

För en person som väger 70 kg motsvarar det 1050 mg (= 210 mL).

Underhållsdos:

För patienter där hemodialys inte krävs: Intermittenta infusioner enligt nedanstående schema. Fortsatt dosering var 12:e timme till dess att etylenglykolnivån har reducerats under 0,2 g/L (3,2 mmol/L). Infusionen ges under 30 minuter.

2:a dos (efter 12 timmar)	3:e dos (efter 24 timmar)	4:e dos (efter 36 timmar)	5:e dos (efter 48 timmar)	6:e dos (efter 60 timmar)
10 mg/kg	10 mg/kg	10 mg/kg	7,5 - 15 mg/kg	5 - 15 mg/kg

Antalet underhållsdoser och dos efter 48 timmar beror på etylenglykolkoncentrationen.

För patienter med kraftigt försämrad njurfunktion och hemodialys: Kontinuerlig infusion av 1 mg/kg/h under hela hemodialysen.

För en person som väger 70 kg motsvarar detta 70 mg/h (= 14 mL/h).

Observera

Ska ges i central ven kateter (CVK).

Hållbarhet och förvaring

I rumstemperatur 24 timmar.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län.

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT