

## Till dig som får behandling som kan ge hudbiverkningar (pemetrexed)

### Dagen före Behandling

#### **Morgon**

Betapred 0,5 mg 8 tabletter (tabletterna löses i vatten)

#### **Kväll**

Betapred 0,5 mg 8 tabletter (tabletterna löses i vatten)

### Dag 1 Behandlingsdagen

#### **Morgon**

Betapred 0,5 mg 8 tabletter (tabletterna löses i vatten)

#### **Kväll**

Betapred 0,5 mg 8 tabletter (tabletterna löses i vatten)

### Dag 2 Dagen efter Behandling

#### **Morgon**

Betapred 0,5 mg 8 tabletter (tabletterna löses i vatten)

#### **Kväll**

Betapred 0,5 mg 8 tabletter (tabletterna löses i vatten)

### **Vitaminisering**

Folacin 1 mg, 1 tablett dagligen under hela behandlingstiden t o m 3 veckor efter sista behandlingen. Start 5 – 7 dagar före första cytostatikakuren

Injektion Behepan 1 mg/ml, 1ml ges veckan före behandlingsstart och sedan var 9:e vecka, ges på Behandlingsenheten

### **Observera**

Använd inget NSAID-läkemedel, t ex Diklofenak, Ibuprofen, Naproxen eller läkemedel innehållande acetylsalicylsyra 2 dagar före cytostatikabehandlingen till och med 2 dagar efter behandlingen.