

Lymfom CHOP 14 d

Kurintervall 14 dagar

Indikation: Högmaligna B-cellslymfom med högrisk, aggressiva T-cellslymfom

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cyke/kur	Adm	Dag
A	Doxorubicin* (Adriamycin)	50	1	1	i.v.	1
B	Cyklofosamid (Sendoxan)	750	1	1	i.v.	1
C	Vinkristin (Oncovin)	1,4 (Maxdos/dostillfälle= 2 mg)	1	1	i.v.	1
D	Prednison	100 mg (fast dos)	1	5	p.o.	1-5
E	Filgrastim alt Pegfilgrastim	Standarddos med avseende på pat vikt	1	8 (om PEG-filgrastim=1)	s.c.	4-11 (om PEG-filgrastim= dag 3)

* Doxorubicin kumulativ maxdos är 550 mg/m²

	Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Dag 12-14 behandlingsuppehåll	Dag 15 ny cykel/kur
A	Doxorubicin	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B	Cyklofosamid	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C	Vinkristin	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
D	Prednison	D	D	D	D	D	-	-	-	-	-	-		
E	Filgrastim alt Pegfilgrastim	-	-	-	E	E	E	E	E	E	E	E		

Övrigt

- Profylax mot pneumocystis jiroveci samt överväg profylax mot virus-svampinfektion
- Överväg T. Allopurinol 300 mg 1x1 under behandlingstiden, samt preliminärt tom 1 månad efter sista kur.
- [Perifer neuropati-monitorering](#)
- Medelemetogen. För detaljer se Cytodose/ELAS. Lägg till T. olanzapin 2,5 mg-5 mg (max 10 mg/dygn)
- [Provtagning, rutinmässig](#)
- Patienten ska uppmanas att dricka rikligt.
- Doxorubicin rödfärgar urinen. Administrering i perifer ven - endast i undantagsfall
- [CHOP 14 kunskapsbanken RCC](#)

Dosreduktion

Substans	Neutrofila	Neutrofila	Neutrofila	TPK	TPK	TPK
	≥ 0,5	0,5-0,2	≤ 0,2	≥ 75	74-51	≤ 50
Cyklofosamid	100%	75 %	Paus	100%	75 %	Paus
Doxorubicin	100%	75 %	Paus	100%	75 %	Paus

Patientinformation

- [Akut, när söka hematologiska sektionen, Länssjukhuset Ryhov akut?](#)
- [Infektion, råd riktade till särskilt infektiöskänsliga](#)

- [Patientinformation från kunskapsbanken RCC](#)

Körschema CHOP -14

Dag		Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	1	Spoldropp med 500ml Natriumklorid kopplas till cyto ad set för spolning före och efter respektive läkemedel		
	2	Ge tablett Prednison ca 1 timme före administrering av cytostatika		cytodose
	3	Ge peroral antiemetika ca 1 timme före administrering av cytostatika		cytodose
	4	Ge Doxorubicin spädd i 250 Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	20-30 min	cytodose
	5	Ge Cyklofosamid spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	30 minuter	cytodose
	6	Ge Vinkristin spädd i 100 Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	10 minuter	cytodose
	7	Dela tablett Prednison för dag 2-5 och skicka med patienten hem		cytodose
Dag 4-11 (alt dag 3)		Lämna ut filgrastim för 8 dagar (alt PEG-filgrastim 1 spruta) och säkerställ att patienten kan injektionsteknik. Om Pegfilgrastim – ge 24-48 timmar efter avslutad cytostatikabehandling		cytodose