Region Jönköpings län

Patientinformation om läkemedlet

Pradaxa

(innehåller dabigatran)

Vad är Pradaxa?
Pradaxa används bland annat för att förhindra blodproppar i hjärnan (stroke) vid förmaksflimmer. Läkemedlet verkar genom att blockera ett ämne i blodet som medverkar i bildningen av blodproppar.

Hur tar man Pradaxa?
Man kan svälja tabletten med lite vatten. Följ de anvisningar om dosering som du fått av din läkare. Då får du bästa möjliga resultat av behandlingen. Pradaxa tas 2 gånger per dygn. Försök göra det till en vana att ta medicinen vid samma tidpunkter varje dag. Välj tillfällen som passar ihop med dina dagliga rutiner, så är det lättare att komma ihåg medicinen.

Om du glömt att ta din medicin bör du ta den så fort som möjligt. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa tablett ska du inte ta någon extra, ta aldrig dubbel dos. Avbryt aldrig på egen hand behandlingen med Pradaxa. En läkemedelsbehandling ska alltid avslutas i samråd med förskrivare.

Det är viktigt att alltid berätta för läkare och tandläkare du har kontakt med att du tar Pradaxa. Då medicinen påverkar blödningstiden kan man behöva göra uppehåll i sin medicinering inför planerade operationer.

Vid behandling med Pradaxa ska en ”Pradaxa-bricka” bäras runt halsen eller i plånboken. Detta som säkerhet om du skulle råka ut för något som gör att du inte själv kan berätta att du tar medicin som påverkar blodets levringsförmåga.

Om man tar andra mediciner samtidigt
Vissa mediciner bör inte användas tillsammans. Därför är det viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner du tar. Berätta även om du använder receptfria mediciner eller naturläkemedel.

Provtagning
För att veta att du får rätt dos kommer du behöva ta prover på din njurfunktion regelbundet (efter 3 månader, 6 månader, samt efter 12 månaders behandling). Kallelse till detta kommer från AK-mottagningen på sjukhuset.

Biverkningar
Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar. De allra flesta får inga biverkningar men en del som använder Pradaxa kan få illamående eller ont i magen. Dessa är ibland övergående.

Eftersom läkemedlet påverkar blodets förmåga att levra sig har man en ökad risk för blödningar, till exempel blåmärken och svullnader, blod i urinen, näsblod eller från mage/tarm. Vid blödning som inte spontant slutar eller om du känner dig ovanligt svag, trött, blek, yr och får ont i huvudet, ökad andfåddhet, bröstsmärta, buksmärta eller kärlkramp ska du kontakta akutsjukvården.

Viktigt att veta
Pradaxakapslarna är fuktkänsliga och får därför inte tas ut från originalförpackningen för att läggas i dosett eller dospåsar.

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se.

Utarbetat av apotekare, Läkemedelsförsörjning Klinisk farmaci. Granskat av specialistläkare, Region Jönköpings län
Augusti 2018