

Amitriptylin (Amitriptylin, Saroten)

Vad är amitriptylin?

Amitriptylin är ett läkemedel som används mot smärta som helt eller delvis orsakats av en irritation eller skada i nervsystemet (neuropatisk smärta). Amitriptylin verkar genom att öka halten av vissa signalsubstanser i kroppen (noradrenalin och serotonin) som är smärtstillande och därmed stärks kroppens eget system för smärtlindring. Amitriptylin används även för behandling av depression, men då oftast i andra doser.

Hur tar man medicinen?

Amitriptylin tabletter kan tas med eller utan mat. Tabletten bör sväljas hel med vatten. Medicindosen trappas upp och anpassas individuellt. Vanligen börjar behandlingen med en tablett amitriptylin på kväll under en vecka. Därefter ökas dosen varje vecka upp till måldos (ofta runt 50 mg dagligen). Läkemedlet tas vanligen till kvällen men vid högre doser kan den delas upp på morgon och kväll. Efter 4-8 veckor brukar behandlingen följas upp. Behandlingen pågår vanligtvis 6 månader efter symtomfrihet, men ibland längre. Följ de anvisningar om dosering som du fått av din läkare. Då får du bästa möjliga resultat av behandlingen. Gör det till en vana att ta medicinen vid samma tillfälle varje dag. Välj doserings-tillfällen som passar ihop med dina dagliga rutiner, då kommer du lättare ihåg att ta medicinen. Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg, såvida det inte är dags för nästa dos. Fortsätt i så fall som vanligt med nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Du bör inte sluta ta läkemedlet utan att ha diskuterat detta med din läkare eller

mottagningssköterska. Om din behandling ska avslutas bör det ske gradvis.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa läkemedel bör inte kombineras. Tala därför om för din läkare vilka andra läkemedel du använder, även receptfria läkemedel eller naturläkemedel.

Biverkningar

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar. Amitriptylin kan orsaka yrsel, sömnhet och nedsatt koncentrationsförmåga. Du bör inte köra bil, sköta avancerade maskiner eller delta i andra aktiviteter som kan vara riskfyllda innan du vet hur denna medicinering påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter. Alkohol kan förstärka läkemedlets biverkningar. Du avråds därför från att dricka alkohol under användningen av amitriptylin. För att minska de vanligaste biverkningarna som muntorrhet, svettningar och trötthet startas behandlingen oftast med en låg dos som långsamt trappas upp. Under behandlingen bör du vara noggrann med din munhygien. Muntorrhet är en vanlig biverkan och ökar risken för hål i tänderna. För att minska denna risk kan du använda fluortillskott eller receptfria salivstimulerande medel. Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta din läkare eller sjuksköterska.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.