

Pazopanib (Pazopanib, Votrient)

Vad är Votrient?

Votrient är ett läkemedel som används för behandling av njurcellscancer och mjukdelssarkom (cancer som kommer från muskler och bindväv). Det verksamma ämnet i medicinen, pazopanib, bromsar tillväxten och spridningen av cancer.

Hur tar man medicinen?

Tabletterna tas tillsammans med vatten men utan föda, minst en timma före måltid eller två timmar efter en måltid. Var noga med att skölja ner dem ordentligt. Du får inte dricka eller äta grapefruktjuice eller grapefrukt under behandlingstiden.

Försök göra det till en vana att ta medicinen vid samma tillfälle varje dag. Välj ett tillfälle som passar ihop med dina dagliga rutiner, då kommer du lättare ihåg att ta medicinen. Tabletterna ska inte tuggas eller krossas.

Vad är rätt dos för mig?

Vi reagerar olika på mediciner. Din dosering kan behöva justeras under behandlingstiden. För vissa personer räcker en lägre dos för att ha nytta av läkemedlet. Det är viktigt att du inte på egen hand avbryter behandlingen. Rådgör med din läkare om du är tveksam till fortsatt medicinering.

Glömda doser

Om du glömt att ta din medicin bör du försöka ta den så fort som möjligt. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa tablett ska du inte ta någon extra.

Provtagning

Provtagning under behandlingen sker enligt läkarens ordination. Du får besked av din kontaktsjuksköterska när provtagning ska ske.

Om du ska vaccinera dig (t.ex. mot influensan), be din kontaktsjuksköterska om råd.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa mediciner bör inte användas samtidigt. Därför är det viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner inklusive receptfria mediciner eller naturläkemedel du använder.

Biverkningar

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar. Av Votrient kan du bland annat uppleva minskad aptit, smakrubbning, högt blodtryck, diarré, illamående, kräkningar, smärta, förändring av hårfärg, trötthet, missfärgning av huden, utslag, huvudvärk, inflammation av munslemhinnan och viktnedgång. Det är viktigt att du rapporterar till din kontaktsjuksköterska eller läkare om du har tecken på infektion, eftersom Votrient kan sätta ner ditt immunförsvar. Vid misstanke om omfattande och/eller oacceptabla biverkningar bör du kontakta din läkare/kontaktsjuksköterska.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.