

Flekainid (Tambocor/Tambocor Retard)

Vad är Tambocor/Tambocor Retard?

Tambocor /Tambocor Retard används för att förebygga och behandla förändringar i hjärtats rytm och hastighet exempelvis vid återkommande förmaksflimmer. Läkemedlet verkar genom att minska den elektriska retbarheten i hjärtat och därför förhindras nya attacker av förmaksflimmer.

Hur tar man medicinen?

Man kan svälja tablettens med lite vatten. Tambocor Retard måste sväljas hel. Försök göra det till en vana att ta medicinen vid samma tillfälle varje dag. Välj ett tillfälle som passar ihop med dina dagliga rutiner, då kommer du lättare ihåg att ta medicinen.

Om du glömt att ta din medicin bör du försöka ta den så fort som möjligt. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa tablett ska du inte ta någon extra.

Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en regelbunden behandling. En behandling ska alltid avslutas i samråd med förskrivare.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa mediciner bör inte användas tillsammans. Därför är det viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner du tar. Berätta även om du använder receptfria mediciner eller naturläkemedel.

Biverkningar

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar. De allra flesta får inga biverkningar men en del som använder Tambocor /Tambocor Retard kan bland annat uppleva en känsla av ostadighet och synstörningar. Oftast

försvinner dessa biverkningar efter några dagars behandling.

Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta din läkare.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.