

Dronedaron (Dronedarone, Multaq)

Vad är Dronedaron?

Läkemedlet används för att förebygga förmaksflimmer. Medicinen hjälper hjärtat att slå i normal takt genom att minska dess elektriska retbarhet. Dronedaron tillhör en grupp läkemedel som kallas antiarytmika och är en effektiv medicin som förhindrar förmaksflimmerattacker. Effekten sätter in långsamt. Maximal effekt ses vanligtvis efter några veckor.

Hur tar man medicinen?

Vanlig dos är 400 mg två gånger dagligen. Ta en tablett tillsammans med frukosten och en tablett med kvällsmåltiden. Tabletterna ska sväljas hela med vätska tillsammans med måltid, var noga med att skölja ner dem ordentligt. Det är viktigt att följa de anvisningar om dosering som du fått av din förskrivare. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Försök göra det till en vana att ta medicinen vid samma tillfälle varje dag. Välj tillfällena som passar ihop med dina dagliga rutiner, då kommer du lättare ihåg att ta medicinen. Om du glömt att ta din medicin bör du försöka ta den så fort som möjligt. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa tablett ska du inte ta någon extra. Ta aldrig dubbel dos! Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en regelbunden behandling. En behandling ska alltid avslutas i samråd med förskrivare.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa mediciner bör inte användas tillsammans. Därför är det mycket viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner du använder. Berätta även om du använder receptfria mediciner eller naturläkemedel. Drick inte grapefruktjuice när

du tar Dronedaron, då det kan höja blodnivåerna av läkemedlet och därmed öka risken för biverkningar.

Biverkningar

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar. De allra flesta får inga biverkningar med en del som använder Dronedaron kan få ökad risk för hjärtsvikt (t.ex. andningssvårigheter, bensvullnad och viktuppgång) eller leverpåverkan (t.ex. ont i magen med illamående, kräkning, aptitlöshet, allmän sjukdomskänsla, gulsot, mörk urin och klåda). Andra kan få biverkningar som långsam puls, onormal trötthet, diarré, illamående, kräkning, magsmärtor, förändringar på EKG eller blodprover (hör kreatininnivå eller förhöjda leverprover), utslag samt ökad känslighet för solljus. Misstänk Dronedaron vid nyttillkomna symtom och kontakta hjärtmottagningen. Medicinen försvinner långsamt ur kroppen vilket gör att både effekt och biverkningar kan kvarstå upp till flera veckor efter avslutad behandling. Sluta ta tabletterna och kontakta omedelbart din läkare om du blir gravid när du tar Dronedaron.

Kontroller

Behandlingen med Dronedaron innebär regelbundna EKG- och blodprovskontroller. Kontrollerna syftar till att tidigt fånga upp potentiella biverkningar. Du kommer att få regelbundna kallelser för blodprovstagning och EKG-kontroller.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se. Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.